



光田綜合醫院換藥資訊

換藥資訊	原有品項	替代品項
藥品英文名稱	PLAQUENIL 200MG	HYDROQUINE F.C 200MG
藥品中文名稱	必賴克瘦膜衣錠	瘡寧膜衣錠
藥商名稱	台灣大昌華嘉股份有限公司	信東生技股份有限公司
健保代碼	BC22376100	AB50142100
許可證字號	衛署藥輸字第 022376 號	衛署藥製字第 050142 號
外觀		
主成分及含量	Hydroxychloroquine 200mg/tab	Hydroxychloroquine 200mg/tab
劑型	膜衣錠	
適應症	圓盤狀及全身性紅斑性狼瘡、慢性多形日光疹、慢性風濕性關節炎、 鎌狀瘧原蟲和間日瘧原蟲引起之瘧疾。	
用法用量	<p>本藥以口服給藥，每次服藥時應與餐點或牛奶併用。</p> <p>瘧疾以外的其他適應症：</p> <p><u>成年（包括老年人）</u></p> <p>給藥的原則應給予最低有效劑量，而且以不超過 6.5mg/kg/day 為原則（依其理想體重計算，而非實際體重），每日劑量為 200mg 或 400mg。</p> <p><u>每日服用劑量為 400mg 的病患：</u></p> <p>治療的起始劑量為每日 400mg 並分次給予，然而，治療效果若有進一步明顯的改善，則劑量可降為 200mg。若劑量降低至 200mg 後，</p>	

	<p>治療反應減弱，則維持劑量應該再增加至每日 400mg。</p> <p><u>兒童</u></p> <p>劑量的給予應為有效劑量，而且依其理想體重計算，以不超過 6.5mg/kg/day 為原則，因此，兒童的理想體重小於 31kg 者，不適合服用 200mg 的錠劑，服藥時應與食物或牛奶併服。</p> <p>瘧疾：</p> <p><u>瘧疾的抑制：</u></p> <p>成人：每星期同一天服用 400 毫克。</p> <p>嬰兒和小孩：每星期、每公斤體重的劑量為 6.5mg，最高不可超過成人的劑量。</p>
副作用	腹瀉、視力模糊、頭痛、皮膚搔癢、食慾差、腸胃不適等。
注意事項	對 Quinine 敏感以及 Glucose-6-phosphated ehydrogenase 缺乏的病人使用 Hydroxychloroquine 應特別小心。
藥品保存方式	保存於室溫 25°C 以下。

105.11.02 藥劑部製