

Potassium Chloride 用藥指導單張

衛教小組 DE0190301

★ 英文發音：poe-TAS-ee-um KLOR-ide

★ 商品名：Slow-K (緩釋鉀糖衣錠) 600 mg/錠劑

POTASSIUM CHLORIDE (氯化鉀注射液 15%) 20mEq/10ML

一. 醫師為什麼會開此藥？

Potassium chloride 可作為鉀離子補充劑，用來補充流失的鉀或鉀缺乏。鉀離子是維持心臟、腎臟、肌肉、神經和消化系統正常功能的基本要素。有些疾病，如：腎臟病和造成有嘔吐或腹瀉的消化道疾病和藥物，特別是利尿劑，會使鉀離子從身體流失。此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

二. 此藥該如何使用？

此藥是口服錠劑，通常一天服用二至三次，每次一錠。隨餐服用或用餐完馬上服用，配合 250 ml 開水或果汁服用。請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。

三. 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，1. 請告訴醫師或藥師，您是否對鉀離子或其他藥物有過敏反應。2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(包含非處方藥)，特別是利尿劑和維他命。如果你有服用下列藥物：amiloride (Midamor)，spironolactone (Aldactone) 或 triamterene (Dyrenium)，請勿服用鉀離子補充劑。3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：是否有心臟、腎臟疾病，愛迪生氏症(腎上腺疾病)。4. 如果您將要進行手術(包含牙科手術)，要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用 potassium chloride。

四. 孕婦用藥等級及注意事項

孕婦用藥等級：C (CCIS) A (2005)。若妳已懷孕，就診時請務必告知醫師並告知週數。

五. 計劃懷孕注意事項

如妳計畫準備懷孕，或在服藥期間已懷孕，就診時請務必告知醫師。

六. 嬰兒哺乳等級及注意事項

若妳給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。

七. 我該遵守什麼飲食注意事項？

如果您在使用代鹽，請告訴醫師，因為許多的代鹽都含鉀，必須調整鉀離子補充劑的劑量。您的醫師也有可能建議您吃含鉀離子的代鹽和富含鉀離子的食物，如香蕉、乾梅子、葡萄乾和牛奶。

八.當忘記服用一個劑量時，我該怎麼辦呢？

儘可能在您想起時，立刻補服一個劑量，並將剩下的劑量以相等的時間間隔在當日服用完畢。但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

九.此藥會造成什麼副作用？我該怎麼做？

雖然 potassium chloride 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請盡快告知您的醫師：胃不舒服、嘔吐。若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：意識混亂，無精打采，手臂、手、腿或腳有刺痛、灼熱、緊或拉扯的感覺，腳很沉重或虛弱，皮膚冷、蒼白或灰。

十.此藥儲存時的條件為何？

將藥物存放於能緊閉之容器中，並置於小孩子拿不到的地方。將藥物儲存在室溫，遠離高溫、高溼度處（勿置於浴室）和直接的陽光照射。將過期或不再需要的藥物丟棄，請教藥師如何適當處理此藥。

十一.我還應知道什麼其他資訊？

定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查，以確定你對 potassium chloride 的反應。不要讓任何人服用你的藥物。有關藥物再調劑的疑問應請教藥師。

藥劑部 製 99 年 7 月修定