

# 黃體素使用時機

衛教小組 DH0060301

主成份	英文商品名	中文商品名
Medroxyprogesterone Acetate	Provera	普維拉
Norethisterone Acetate	Primolut-Nor	普女路通

## 一、適應症：

續發性停經、痛經、經前症狀，或因荷爾蒙不平衡所造成的子宮異常出血。

## 二、用藥方式：

一般是在月經週期的第 16 天或第 21 天開始服用，每日固定的時間服藥一次，連續服用 5~10 天。月經可能在服完最後一劑後的 3~7 天開始。續發性停經患者則可在任何一天開始使用本劑。

## 三、用藥注意事項：

1. 服用本藥前如有下列事項，請告訴醫師：過敏病史、懷孕或哺乳、糖尿病、血栓疾病或中風、心臟、肝臟、腎臟疾病、乳房或生殖器官的腫瘤、憂鬱、癲癇、偏頭痛、高血脂、高血壓、氣喘、原因不明之陰道出血，及同時服用之藥物。
2. 抽血檢查或開刀前(包括牙科手術)，請告訴醫師。避免抽煙，注意牙齒衛生。
3. 請勿讓其他人服用您的藥物。置於緊密容器，室溫儲存，並避免兒童取用。

#### 四、此藥可能引起的副作用及處理方式：

1. 可能產生無月經、月經量少、體重增減、腹痛、皮膚出現膿皰或褐色斑、憂鬱、腳腫、乳房不適、粉刺、睡眠困擾，如果情況嚴重，請告訴醫師。
2. 若發生下列情形，請到急診就醫：呼吸急促、皮膚或眼睛泛黃、突然或嚴重的頭痛、視覺改變、說話不清、頭暈或昏厥、手臂或腳有無力或麻木感、胸痛、腹股溝或腿部疼痛、胸悶等。

#### 五、忘了服藥該怎麼辦：

想起時儘快補服，如果想起時已接近下一次服藥時間，請不要補吃那一次已忘記的藥。

#### 六、懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕分級 X：懷孕婦女禁用，若服藥中懷孕，請儘速告知醫生。

在哺乳婦女乳汁可測得，對嬰兒作用未知，治療期間暫停哺乳或改用其他藥物。

藥劑部 製 99 年 7 月修訂