

卡介苗接種須知

一、什麼是結核病：

結核病是一種經由開放性肺結核的病人咳嗽、打噴嚏時將細菌的飛沫散佈在空氣中，如果沒有抵抗力的人吸入後，可能造成感染，尤其是密閉陰暗之空間時。通常結核菌被吸入肺部後，細菌就會開始繁殖成為菌血病後容易使肺部發炎稱為肺結核或肺癆，病人會有咳嗽、倦怠、午後發燒、血痰和體重減輕。在肺部的結核菌亦可經由血液循環傳到身體其他部位，而引起其他組織器官的結核病，如骨骼、肝臟、腦部、腎臟的結核病其因部位不同，症狀也都不一樣。

二、認識卡介苗：

目前在國內使用乾燥活性減毒卡介苗來預防結核病，一般在結核病病例較多的國家，主張新生兒還沒受到感染時接種卡介苗，以便產生對結核病的抵抗力，並可避免造成結核性腦膜炎等嚴重症狀。

三、什麼情況不宜接種卡介苗：

1. 發高燒。
2. 患有嚴重急性症狀及免疫功能不全。
3. 出生時伴有其他嚴重之先天性疾病。
4. 新生兒體重低於 2500 公克時。
5. 可疑之結核病患，勿直接接種卡介苗，應先做結核菌素測驗
6. 嚴重濕疹。

四、接種卡介苗後之反應及注意事項：

1. 接種後 7—14 天在接種部位有紅色小節結。
2. 紅色小節結逐漸擴大，會微有痛癢，4—6 週可變成膿泡或潰瘍，不可擠壓或包紮，只要保持清潔，用無菌紗布或棉球擦即可。
3. 經 2—3 個月潰瘍自然癒合，有時同側腋窩淋巴腺會腫大，要立即看醫生做檢查。
4. 如果接種部位腫脹厲害有感染情形時，應立即看醫生做檢查。