

三合一疫苗

一、認識三合一疫苗 (DPT)：

三合一疫苗 (DPT) 是用來預防白喉、百日咳、破傷風，它是利用破傷風和白喉桿菌所分泌出來的外毒素，經減毒做成類毒素並與被殺死的百日咳桿菌混合製成。如果要對這三種疾病有好的抵抗力，幼兒要在一歲內接種三劑三合一疫苗，並在一歲半再追加一劑。

二、什麼情況不能接種三合一疫苗 (DPT)：

1. 發高燒。
2. 患有嚴重疾病者，但一般的感冒不在此限。
3. 病後衰弱，有明顯的營養不良。
4. 患有心臟血管疾病、腎臟、肝臟疾病者。
5. 患有進行性痙攣症或神經系統有問題者，但已不再進行的神經系統疾病，如腦性麻痺等則不在此限。
6. 對 DPT、DP 或 Td 疫苗的接種曾有嚴重反應者，如痙攣等。
7. 正使用腎上腺皮質素或抗癌藥物治療者。
8. 六歲以上。

三、接種三合一疫苗後可能發生的反應及注意事項：

1. 接種後局部常有紅腫、疼痛現象，兩天內可能有輕度發燒、全身不適感覺，偶有食慾不振、嘔吐、輕微下痢症狀，通常 2—3 天會恢復。
2. 根據國外的統計，接種 DPT 疫苗的兒童，每 330 人中有一人會發燒至 40°C 或以上，須看醫師處理。
3. 少數人在接種部位會發生膿瘍，父母必需注意觀察，如接種部位紅腫、有硬塊不退或高燒不退，應立即看醫師處理。
4. 另外每 100 人約有 1 人可能出現持續性的哭鬧 3 小時以上，每 900 人中有 1 人有異常尖銳的哭鬧。
5. 有一些較少見到嚴重的反應，如 11 萬人中偶爾發現一個是比較嚴重的腦部神經問題，31 萬人中有 1 人屬於永久性腦病變，所以要注意，如果小孩經醫師診斷不能接種疫苗時，就必需遵照醫師的建議。
6. DT 和 Td 疫苗的反應並不普遍，通常只是疼痛和低度發燒。