

消化道攝影是一種特殊的 X 光檢查，其檢查的範圍包括食道、胃與十二指腸，為了使這些部位能夠在 X 光上顯現，受檢者必須服用一種顯影劑—鋇劑，這是一種白色乳狀濃稠液體，它會暫時性附著在腸胃道內壁，而在 X 光上表現成白色。

一、檢查目的：

可以觀察到消化道蠕動的情形，也可以藉由鋇劑的附著，將消化道的黏膜狀況表現出來，因此對於潰瘍、腫瘤或發炎反應等變化，是相當好的診斷方法。

二、檢查前注意事項：

1. 如果你可能已經懷孕，請於檢查前告知臨床醫師或放射科醫師。
2. 檢查前 8 小時務必要禁食，以避免因胃腸內有食物殘渣而影響病灶之正確判讀。
3. 檢查當日早餐禁食(含開水)直到檢查完畢為止。
4. 有固定服用藥物者，不可自行停藥，可用少許白開水配合藥物服下。
5. 糖尿病患者，因為沒有進食所以降血糖藥物需減量以預防低血糖休克的發生。至於其他藥物可能的影響請與您的主治醫師討論。

三、檢查過程：

1. 為了使胃能夠脹滿氣體，使檢查結果更清楚，必須要吞服一種蘇打粉合著一小杯的開水迅速吞下，千萬不要在嘴巴內停留或張口，此蘇打粉的作用是利用氣體使胃、腸道脹起來以利觀察黏膜的情形。
 2. 為了要把胃、腸道各部份皆能看得清楚，檢查過程中需要在檢查台上平躺、俯臥、側躺或各個姿勢之翻轉（體弱者請務必有家屬在旁陪伴及協助），同時以 X 光視需要做不等次數之照相，以確保完整攝影檢查。有時為了展開重疊的腸子，會用圓角錐輕壓肚子，請儘量忍耐。
- 檢查台上有把手可讓您抓握，檢查中請握好。

www.ktgh.com.tw

四、檢查後注意事項：

1. 除非病情需要限制水份者，請務必飲用大量的白開水(至少 1000cc 以上)，避免鋇劑沉澱積存在腸內造成便秘或影響正常功能。
2. 病人檢查後兩天仍未解大便應告知醫護人員予以處理。
3. 服用鋇劑後解大便呈白色是正常。

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡
祝您 身體健康 萬事如意