

96. 7. 04

X光攝影顯像劑 淋皮道卵造影液

LIPIODOL ULTRA-FLUIDE

【衛署藥輸字第10635號】

簡介

Lipiodol 是由罌粟子油提煉出來的一種脂肪酸，將其構造中的甘油以乙醇酯化，即得流動性更大的無菌碘化顯影劑Lipiodol Ultra-Fluid。

Lipiodol Ultra-Fluid 肌肉注射、無痛覺，耐受力佳，不傷害人的體腔，注射於關節腔時，無回流現象。Lipiodol U-F 注射後，慢慢游離出碘，緩緩地擴散，漸漸被吸收，因粘度比水溶性顯影劑大，流動性較小，故可長期觀察病況的變化。稍加熱，Lipiodol U-F 流動性增加，但吸收速度太快將發生毒性。故使用粘度適當，吸收情況良好的Lipiodol U-F 效果較佳。

Lipiodol Ultra-Fluid 的排泄迅速，注射後24小時即排泄出50%，72小時即排泄出70%，以碘化物形態由尿液中排泄。

凡 X 光照相均可使用 Lipiodol U-F 為顯影劑，可照出清晰的 X 光片，指示出正確地結果，在診斷上極具價值。

Lipiodol U-F 用於子宮輸卵管照相時，可增加懷孕的機會，縮短不孕期，兼具診斷與治療之雙重效果。

理化性質

Lipiodol U-F 外觀似天然植物油，並有類似的顏色及粘度，15°C時的密度為1.280。碘含量為每公克含碘0.38克，每毫升含碘0.48克。

放射科的用途

Lipiodol U-F 含碘量高，所以 X 光不能透過。本品不與體液混合，而且其比重大，故凡用水溶性顯影劑無法照出相片時，使用本品最適宜。

本品尚有一優點，即體內深部纖細體腔照相時，使用鋇或水溶性顯影劑的效果不佳，都可以 Lipiodol U-F 來取代，而獲得清晰的 X 光照片，例如淋巴照相、瘻管照相、嬰兒腸道照相等。

適應症

—子宮輸卵管 —瘻管 —淋巴腺 —膿腫 —唾腺 —膽管顯影用 —尿道

用法

除靜脈注射方式不宜之外，其他各種注射方式均可。

用量

- 淋巴照相：單側淋巴管之用量為5~6ml。
 - 子宮照相：5~10ml。
 - 乳房照相：0.25~4ml。
 - 唾腺照相：腮腺—2~5ml / 頰下腺—1ml。
 - 尿道照相：10ml或20ml或30ml，依需要而定。
- 注射時，持續地緩緩加壓，以幫助易於注射。

本藥限由醫師使用

禁忌症及注意事項

- 對碘過敏及甲狀腺功能不良或肺機能不全的人，應特別小心。
- 瘻管注射時需極小心，以免穿刺到血管。
- 新近出血的病人，不宜使用本品。
- 注射Lipiodol U-F與診查人員技術，照相部位不同，受檢查之身體狀況均有關，應謹慎多加注意。

包裝

10公撮，1至50安瓿裝

製造廠：GUERBET

廠址：16-24, rue Jean Chaptal 93600 Aulnay-sous-Bois, France

藥商：台灣古爾貝特股份有限公司

地址：台北市104八德路二段182號

電話：(02)87730899