

# “晟德” 喘 敏 糖漿 (可多替芬)

Athmin Syrup "Center" (Ketotifen)

衛署藥製字第 GMP  
G-6647 號  
042932

## 簡 介：

喘敏是兼具抗過敏及抗組織胺之非支氣管擴張性抗氣喘劑。臨床實驗證實長期服用對於輕微的兒童特異性氣喘具有療效。連續使用喘敏，能降低氣喘發作頻率及強度，同時可減少併用支氣管擴張劑如：theophyllines 及  $\beta_2$ -agonist，而不影響肺功能如：FEV、FVC及 PEF。服藥的第一週即可感受到症狀之改善。藥理實驗同時證實本品可抑制其它與支氣管收縮有關的介質之釋放，如 PAF (Platelet Activating Factor)、leukotriene C4及 D4等。

主 成 份：每毫升(ml)含有

Ketotifen Fumarate.....0.276 mg  
(Equivalent to Ketotifen 0.2mg)

## 適 應 症：

支氣管氣喘、過敏性支氣管炎與乾草熱有關之氣喘症狀，預防及治療過敏性鼻炎、過敏性皮膚反應。

用法用量：本藥須由醫師處方使用。

- (1). 3歲以上的孩童：一般用量為一天2次，早晚各服5ml。
- (2). 6個月到3歲的孩童：一般為早晚各服一次，每次依體重給藥0.25ml/kg。
- (3). 對鎮靜作用較敏感的患者，可於治療的第一週，將每日建議量的一半分成2次(早晚)或1次(晚上)服用，接著5天內增到建議之全量。

## 注意事項：

1. 使用本品之時切忌停用原先使用中之抗氣喘藥物如：Xanthine 衍生物、 $\beta_2$ -agonist、類固醇、Sodium Cromoglycate。
2. 本品治療初期可能有嗜睡之傾向，須操作精細工作或駕駛者，應謹慎使用。
3. 併用口服降血糖藥會減少血小板數目。
4. 本品會加強鎮靜藥、安眠藥、抗組織胺、酒精等之中樞抑制作用。
5. 本品不得用於對安息香酸鹽(benzoate)過敏之患者。

## 副作用：

1. 發生率低，與安慰劑相當。
2. 併用降血糖劑可能造成紫斑症(Thrombocytopenia)。
3. 過量會造成嗜睡或嚴重的鎮靜、心搏過速、低血壓、抽搐等，尤其是兒童更為常見。

包裝：60~4000ml 塑膠瓶裝/玻璃瓶裝

## 貯存：

- (1) 本品應置於兒童不及之處。
- (2) 請密封儲存於室溫，避免陽光直射。

## 製造廠：

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠  
CENTER LABORATORIES INC.

廠址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路2號

公司電話：(02)2547-4332 圖文傳真：(02)2545-3562

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820