

“生達”  膠囊250公絲
(妥內散酸)

Trand[®] Capsules 250 mg

"Standard" (Tranexamic Acid)

Plasmin是造成出血症狀(如紫斑病、再生不良性貧血、白血病)及滲透性皮膚疾患的重要原因,“生達”血迅注射液及膠囊可以阻斷Plasminogen activator與Plasmin之作用,所以可以抑制各種出血症狀,同時也可以強化血管,改善血管通透性而抑制過敏性皮膚之發生。

主 成 分: 每一膠囊含:

Tranexamic acid 250 mg

特 點:

- 1.強力的抗Plasmin、止血作用。
- 2.能改善過敏及炎症反應。
- 3.毒性低、副作用少,亦無致畸胎作用。
- 4.作用時間長,吸收快,效果優異,可於短時間內到達最高血中濃度。

適 應 症:

全身及局部出血或出血性疾病。

用法用量:

通常成人一日量3-8粒,分三到四次服用。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項:

以下的病人請慎重投與:

- 1.已得血栓之病人(腦血栓、心肌梗塞、血栓靜脈炎)或者可能引起血栓之病人。
- 2.有凝血障礙之病人(要與Heparin併用才可以)。
- 3.對本劑已產生過敏之病人。
- 4.高齡者投與:一般高齡者生理機能低下,最好減量使用。

副 作 用:

- 1.過敏症:萬一發生過敏現象,請停止投藥。
- 2.皮膚:偶有搔癢感及發疹等症狀。
- 3.消化器官:(口服)食慾不振、噁心、嘔吐。
- 4.其他偶有輕微睡意之可能。

相互作用:

與其他止血性製劑大量併用可能有增加血栓形成之傾向,如須併用須慎重投與。

包 裝: 1000粒以下塑膠瓶裝、盒裝。

衛署藥製字第041226號 G-5765 Code No. CT-03 2215380



cGMP 藥廠 • ISO 9001
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台灣省台南縣新營市土庫里六號之二十

S9704