

"中美"便通樂®膜衣錠

THROUGH® F.C. Tablets "C.M." (Sennosides)
衛署藥製字第037697號 G.M.P. G-0695

【成 分】每錠含Sennosides.....20mg
(as sennoside A+B.....12mg)

【適 應 痘】緩解便祕。

【用法用量】一日一次，於睡前(或空腹時)服用。成人1次1-2錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，1次1/2-1錠；3歲以上未滿6歲，1次1/4-1/2錠；未滿3歲之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【藥理特性】

1. 本藥是參考美國藥品典籍PDR及日本藥局方之處方，經本公司研發團隊設計配方，以科學化之製藥技術、CGMP最高品質要求標準，研製而成，外加膜衣，於晚上睡前服用後可發揮排便效果。
2. 本藥品採用天然植物Senna(番瀉)葉生藥抽提，主要有效成分為Sennoside A及B合劑，在動物只要不超量服用，劑量適當，本藥副作用可說是很低的，因此已被使用於習慣性便祕、老人性便祕及手術後的便祕。其作用機轉為投與後，於胃及小腸並未吸收，而是以原形到達大腸作用部位，經腸內細菌作用後生成代謝產物Rhein anthrone直接刺激大腸壁而促進大腸蠕動，才具有排便、緩下作用。因此其對結腸興奮作用具專一性，不會影響較上段胃腸道之正常蠕動。
3. 便祕是指排便時間比一般正常的時間慢，而且糞便時常滯留於大腸及盲腸時間長，便祕並不會構成生命危險，但便祕過久也會有誘發其他症狀之虞(如痔瘡、面皰、皮膚乾燥、焦慮、失眠、口臭等)對身體造成不良影響。
在排除便祕因素為腸病變引起之外，便祕常見原因有壓力、藥物、飲食習慣、作息、缺乏運動、肥胖、妊娠(懷孕)、老年人胃腸蠕動功能低下....等，針對各不同因素作適度調適改善，再配合服用本藥，效果更佳。
Sennosides被發現可緩解許多功能性便祕，可藉由促進調節排泄功能而幫助便祕患者復原。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 瀉劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續服用一星期以上。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便祕。

【警 語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其它瀉劑。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
4. 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
5. 使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
6. 使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
7. 除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿3歲之嬰幼兒不得使用。
8. 禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
9. 長期使用會造成電解質不平衡及水分缺乏。
10. senna類會使酸性尿液呈黃、棕色，鹼性尿液呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。
11. 本藥含senna類成分，若有皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

【包 裝】2-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存條件】25°C以下，避免陽光直射。



中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166