

"瑞安"	<b>舒喘</b>	內服液 5.34毫克/毫升
"Purzer"	(茶鹼) <b>Ventol</b>	Liquid 5.34mg/mL
(Theophylline)		
瑞安大藥廠股份有限公司	PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.	

GMP優良藥品G-3517號

衛署藥製字第036330號  
本藥須由醫師處方使用

#### 【成份】

Each mL Contains:  
Theophylline Anhydrous.....5.34mg

#### 【適應症】

氣喘及支氣管痙攣。

#### 【用法用量】

成人：一次劑量範圍為200~250mg，每6小時給藥一次。  
6~12歲：一次劑量範圍為125~250mg，每6小時給藥一次。

#### 【警語】

- 劑量使用過高可能會造成毒性，所以需定期檢驗血漿中 Theophylline 濃度，一般血漿中濃度若超過20µg/mL則易產生毒性反應；其最常見之一般早期毒性有噁心、浮躁，但有些病人會直接產生心室節律不整或驚厥。
- 傳統劑量易造成高 Theophylline 血漿濃度的原因：
  - 較低身體血漿肅清率之患者(由於短暫性的心臟代償機能衰敗造成)。
  - 肝臟功能不佳或慢性阻塞性疾病患者。
  - 年齡大於55歲，尤其是男性。
- 許多病人會因 Theophylline 血漿濃度過高而產生心動過速現象，且會造成潛伏性的心律不整患者病情惡化。

#### 【注意事項】

- 不可與含 Xanthine 類成份之製劑合用。
- 有嚴重心臟疾病、血氧過少、高血壓、甲狀腺機能旺盛、急性心肌傷害、肺性心臟病、肝臟疾病、老年患者(由其是男生)、初生嬰兒需慎重使用。
- 充血性心臟衰弱者使用時需特別注意。
- 曾有消化性潰瘍記錄之患者使用時需特別注意。
- 孕婦需評估用藥風險後慎重使用。
- 使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生之藥品相互作用。

#### 【副作用】

主要副作用的產生均是因為血漿中濃度過高所致：

- 腸胃道方面產生噁心、嘔吐、上腹部疼痛、吐血、腹瀉。
- 中樞神經系統方面產生頭痛、刺激感、浮躁、反射應激性過度、肌肉痙攣、陣攣性或強直性驚厥。
- 心臟血管方面產生心悸、心動過速、期外收縮、潮紅、高血壓、循環不良、心室節律不整。
- 呼吸系統方面產生呼吸促迫現象。
- 腎臟方面產生尿蛋白、腎小管細胞及紅血球細胞排出增多，尿液增多。
- 其它方面產生高血糖症、抗利尿荷爾蒙 ADH 不正常現象。

#### 【藥物交互作用】

- 與 Ephedrine 合用會增大毒性。
- 與 Frusmide 合用會增加利尿作用。
- 與 Reserpine 合用易造成心動快速。
- 與 Clindamycin、Lincomycin或Erythromycin合用會增高 Theophylline 血中濃度。

#### 【儲存】

請存放於室溫25°C以下陰涼處所。

#### 【包裝】

4000毫升以下塑膠瓶裝。

#### 【製造廠】

瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠  
公司：台北市松山區光復南路1號12樓之2  
工廠：桃園縣觀音鄉草漯村大同一路26號  
服務電話：(02)2766-0887

C0105807