

營 養 劑

“信東”

美 達 研 注射液 50%

Vitagen INJECTION 50% “S.T.”

【組 成】

Each ml contains:

Glucose.....500mg

Water for Injection added to make.....1ml

【適 應 症】

營養補給。

【用 法】

- 1.皮 下 注 射 :將注射液注於大腿部皮下為佳。
- 2.靜脈內注射:尤其是滲透療法及使用大量的糖分時以本法為便利。

本藥限由醫師使用。

【注 意】

- 1.高張液行靜脈內注射時要在可能範圍內緩慢地施行，大量注射時將該液用溫水加溫後使用為宜。
- 2.靜脈內注射時，因體質之不同，注射之後，有時可能誘發輕度的惡寒戰慄或發燒，這時使用強心劑，或令安靜即可。
- 3.對於糖尿病重症患者，宜避免使用本劑為佳。

【使用之注意事項】

(一)取用時：

- 1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
- 2.若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(二)輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
- 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(coring)產生碎片。
- 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【包 裝】

玻璃瓶：150ml, 300ml, 500ml, 1000ml

塑膠安瓿：20ml,

塑膠瓶：500ml, 1000 ml

內衛藥製字第 006067 號



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路22號

IV 096 ④