

合成副腎皮質荷爾蒙
“世達” 蒙治爽錠 4公絲
(甲基培尼皮質醇)
Metisone Tablets 4mg “S.D.”
(Methylprednisole)

衛署藥製字第038955號 (GMP. G-4843號)

〔簡 介〕

“世達”蒙治爽錠4公絲，承襲過去2公絲之嚴謹的製造及品管傳統，精心研製。

〔成 分〕

每錠中含：
Methylprednisolone.....4mg

〔適 應 症〕

風濕性熱，風濕樣關節炎及過敏性症狀。

〔用法用量〕

一日4-48mg (1-12錠)，分1-4次服用；視症狀增減之。本藥須由醫師處方使用。

〔體內藥物動態〕

40mg單次口服，2小時可達最高血中濃度329ng/ml (20人平均)；主要代謝器官為肝臟。

〔注意事項〕

- (1)使用禁忌：全身性黴菌感染及對本品過敏之患者禁用。
- (2)患者在使用副腎皮質荷爾蒙治療時，須避免感染水痘及麻疹，若感染須慎重處理。
- (3)長期使用，若立即停藥，則會產生發熱、頭痛、食慾不振、無力、疼痛等禁斷現象，故若停藥，須徐徐減量，而後停止。
- (4)感染症，續發性副腎皮質機能不全，消化性潰瘍，糖尿病精神障礙，若有其他適當之療法，則不用本品。
- (5)原則禁忌，但有必要時須慎重投與(a)全身性真菌感染(b)結核性疾患(c)單純疱疹性角膜炎(d)白內障(e)青光眼(f)高血壓(g)電解質異常(h)血栓症(i)短期內做過心臟手術(j)急性心肌梗塞。
- (6)慎重投與(a)骨質粗鬆(b)腎不全(c)甲狀腺機能低下(d)肝硬變(e)脂肪肝(f)脂肪栓塞(g)重症肌無力(h)高齡者。
- (7)孕婦，授乳婦使用可能有催畸形，新生兒，副腎不全之狀況，故須謹慎評估其必須性。
- (8)小兒使用會抑制發育，長期投與會使腦壓亢進。
- (9)副作用：
 - (a)感染症：誘發感染症，使感染症惡化。
 - (b)內分泌：偶有續發性副腎皮質機能不全，糖尿病，月經異常。
 - (c)消化器：偶有消化性潰瘍、胰炎、下痢、噁心、嘔吐、胃痛、腹部膨滿，口渴、食慾不振、食慾亢進。
 - (d)精神神經系：偶有精神變調，抑鬱症，欣快感，失眠，頭痛，暈眩，痙攣。
 - (e)肌肉、骨骼：偶有骨質粗鬆症，大腿骨及上腕骨的骨頭無菌性壞死、肌炎、肌肉痛、關節痛。
 - (f)脂質，蛋白質代謝：偶有滿月臉，犀牛肩，氮素負平衡，脂肪肝。
 - (g)體液，電解質：偶有浮腫，血壓上昇，低鉀性鹼中毒。
 - (h)眼：連續使用會使眼壓上昇，故須定期檢查眼壓；另偶有後囊下白內障，青光眼，眼球突出。
 - (i)血液：偶有白血球增多，血栓症。
 - (j)皮膚：偶有痤瘡，多毛，脫毛，色素沉澱，皮下出血，紫斑，瘙癢，發汗異常，顏面斑，創傷治癒障礙，皮膚薄化，脆弱化。
 - (k)其他：偶有發熱，疲勞，體重增加，精子數及運動性或增或減。
- (10)相互作用：(a)與Barbituric Acid, Phenytoin, Rifampicin併用時，本品代謝會增快，作用會降低。
(b)與水楊酸衍生物併用時，本品須減量，以免造成水楊酸中毒。
(c)與抗凝血劑，口服降血糖劑併用時，會降低上類藥品之作用。
(d)與利尿劑(鉀保持性利尿劑外)併用，會造成低血鉀症，用量須注意。
(e)與Cyclosporin併用時，會使上類藥品血中濃度上昇。

〔包裝及貯存〕

2's-1000's瓶裝及鋁箔盒裝，室溫貯存。

Code No:T-089



世達藥品工業股份有限公司

台中市工業區15路2號