

喜滿佳[®]

懸浮液

Simagal[®] Suspension

喜滿佳含有排除空氣泡沫特效的活性 Dimethyl Polysiloxane 與精製的氫氧化鋁·氫氧化鎂配合，即可排除胃氣，制止各種胃痛，復能保護胃黏膜，抑制過量之胃分泌，並不影響正常消化功能，效力迅速可靠，具有制酸、解脹及保護黏膜之作用，為確實有效之消化不良、胃灼熱、胃腸脹氣、胃酸過多之胃腸治療劑。

主 成 分：每10ml懸浮液中含有：

Dimethyl Polysiloxane.....250mg
Magaldrate.....375mg

藥理作用：

1. Dimethyl Polysiloxane：

此藥物能降低液體的表面張力，具有強大的消泡作用，在生化學方面為不活性化化合物，故完全無毒性及無任何副作用，不但不影響體內酵素之活性，反而有益於食物與腸內酵素之混合。

此藥物因能匯集腸內小氣泡，而產生緩下作用，使氣體易於排出體外，由此可知本品應用於各種消化器疾患，諸如腹部脹滿感、鼓腸、空氣嚥下症及腸內氣泡之驅除等。

2. Magaldrate：為緩衝性的制酸劑，具有中和與吸著胃酸之作用。

Magaldrate係一種以特殊方法製造而成的新化合物：

- 具有強力而迅速的制酸能力與持久的緩衝作用。
- 使胃液長時間維持於安全而適當的pH範圍內。
- 不影響胃腸道正常機能，無氣脹、便秘或下痢等副作用。
- 不被體內吸收，無鹼中毒或電解質失調之虞。

適 應 症：緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良、解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

用法用量：通常一日三次，每次5~15ml，二餐之間與睡前服用。醫師藥師藥劑生指示藥品。

副 作 用：

1. 含鎂之制酸劑可能會引起腹瀉。
2. 含鋁之制酸劑可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

注意事項：

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 液劑使用前須振搖均勻。
6. 本品每10 ml之酸中和能力不少於8.5 mEq。
7. 本品的鎂含量每10 ml不少於5 mEq。
8. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

警 語：

1. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，一天內不可服用超過每日最大劑量之制酸劑，也不可連續服用每日最大劑量兩週以上。
2. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，未滿3個月之嬰兒不得服用。
3. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用制酸劑。
4. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
5. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，制酸劑不得併用其它藥品。

包 裝：15ml x 100包以下盒裝。3800ml以下瓶裝。

衛署藥製字第005662號 Code No. LS-01 3214110



cGMP 藥廠·ISO 9001
生達化學製藥股份有限公司二廠
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台灣省台南縣新營市開元路154號

S8504