

“瑞德” 停咳喜液 0.8公絲/公撮(布他米雷特)
Sutussi Liquid 0.8mg/ml (Butamirate Citrate)

GMP
衛署藥製字第 G-6895 號
043362

主成份：每毫升(ml)含有

Butamirate Citrate.....0.8 mg

藥理作用：

1. 本藥唯一的作用主成分 Butamirate Citrate 是一種與鴉片所含的生物鹼在化學上均無相似之處的止咳鎮靜劑。Butamirate Citrate 除了有顯著的止咳作用外，還能夠逐漸改善呼吸道受阻的程度，這一點可以從患者肺活量的逐漸增加獲得證明。
2. 口服 Butamirate Citrate 可以被人體迅速、完全的吸收。喝下 150 mg 的 Butamirate 液之後 1.5 小時，可測得主要代謝產物 Phenyl-2-lactate 在血漿中的最大濃度達 6.4 μ g/ml。Phenyl-2-lactate 在血漿中濃度半衰期，約為 6 小時。
3. Butamirate 的水解現象為主要被水解成 Phenyl-2-lactate 及 Diethylaminoethoxyethanol 始於血漿中。這兩種代謝產物都具有止咳作用，而且和 Butamirate 一樣，很容易與血漿蛋白結合(約 95%)。這就是它們在血漿中濃度半衰期之所以會很長的原因。Phenyl-2-lactate 會經由水解被部分代謝，這三種代謝產物主要是經由腎臟排出體外，酸性代謝產物大部份會與尿酸結合。

適應症：

鎮咳(感冒、支氣管炎、氣喘性支氣管炎所引起之咳嗽)。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

成人：每次服用 7.5 ml，每日 3~4 次。

兒童：每次服用 5 ml，每日 3 次。

服用限制：

對主成份 Butamirate Citrate 過敏者禁用。

懷孕期/哺乳期：

懷孕危險等級 B。這表示在動物身上進行的生殖試驗中，並未顯示特別嚴重的危險。但目前為止尚無孕婦試驗報告的發表。因此，為了安全起見，懷孕初期 3 個月內應避免服用此劑；3 個月之後方可服用。另外，由於缺乏關於本藥的主成份是否會從母體進入母乳內的資料，為了安全起見，母親在哺乳期間欲服用本藥，應特別小心。

副作用：

可能有噁心、發疹、腹瀉、暈眩等現象(約1%的病人會出現此副作用)，請告知醫師發生的副作用。降低服用劑量即可消除這些副作用。

交互作用：

目前為止尚未發現本藥會與其他藥物產生交互作用。

劑量過多：

服用過多劑量的本藥可能產生噁心、嘔吐、體重下降、血壓降低等症狀。

劑量過多的緊急處理措施：給予活性炭、含鹽的瀉藥、一般的心臟呼吸措施急救。

包裝：30~4000ml 塑膠瓶裝

貯存：

(1) 本品應置於兒童不及之處。

(2) 請密封儲存於室溫，避免陽光直射。

製造廠：

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠

CENTER LABORATORIES INC.

廠址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路2號

公司電話：(02)2547-4332 圖文傳真：(02)2545-3562

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

委託者：

瑞德生技股份有限公司

台北市內湖區文德路22巷9弄38號1樓

14S13-N01