

「史帝富®」治疣液 Duofilm®

衛署藥輸字第017603號

說明：

「史帝富®」治疣液 (Duofilm) 為一使用於局部之製劑，內含 16.7% 之 Salicylic Acid 及 16.7% 之 Lactic Acid，為其有效成份，其賦型劑為 Flexible Collodion。 「史帝富®」治疣液 (Duofilm) 之主要藥理作用在其 Salicylic Acid 及 Lactic Acid 之角質溶解作用。

臨床藥理學：

Salicylic Acid & Lactic Acid 究竟如何治療疣，尚未完全明瞭。其作用似以其角質溶解作用，除去被疣滲過性毒所感染之上皮細胞。

適應症：除疣劑。

本藥為醫師、藥師、藥劑生指示藥品

禁忌症：

· 糖尿病人及有血液循環障礙之病人不宜使用。亦不能使用於治療黑痣 (Moles) 或胎記 (Birthmarks)。

注意事項：

· 「史帝富®」治疣液只限於外用，亦不能觸及眼睛或黏膜部位。倘觸及眼睛或黏膜部位時，可用清水沖洗，為除去殘存之 Flexible Collodion，可繼續用清水沖洗 15 分鐘。亦不可使「史帝富®」治疣液塗於正常之皮膚上。倘感刺激性太強烈時，可停止使用。此藥極具可燃性，放置處應遠離火源。不使用時應將瓶蓋旋緊。可存放 25°C 以下。

副作用：

· 倘塗於疣週圍之正常皮膚時，會有局部性之刺激。如暫停使用，此種刺激會消失，待無刺激時再恢復使用，切記應只使用於疣之部位。

劑量及用法：

· 在使用前先用熱水浸泡疣之部位至少 5 分鐘，並用浮石或銼刀輕輕磨去多餘角質。然後用乾毛巾擦乾。使用所附之刷子滴 2~4 滴於疣之部位，每天一次。在滴第二滴以前，必須等前一滴乾後才能再滴。一定要注意勿塗及疣週圍之正常皮膚，擦過藥後可用 OK 繩輕敷於疣之表面。治療 2~4 週後，即會見進步。

包裝：

· 15ml 瓶裝，瓶上附有塑膠刷。儲存注意事項見注意事項欄。

製造廠：

英國史帝富大藥廠授權愛爾蘭史帝富大藥廠

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

(P) Finisklin Business Park, Sligo, Ireland

Stiefel Laboratories (UK) Ltd.

(O) Holtspur Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Bucks, UK

藥廠：

台灣史帝富大藥廠股份有限公司

台北市龍江路 333 號 3 樓之 1

電話：02-25057720, 25057726

EF043-3