

燙膚舒 乳膏10公絲/公克(達淨礦胺銀)

SILIVERZINE Cream 10mg/gm "Sinphar"

(Sulfadiazine Silver)

— 皮膚感染治療劑 —

特點：

1. Sulfadiazine Silver 具有廣泛之抗菌作用，對革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌和真菌均有效。
2. Sulfadiazine Silver 之抗菌作用機序與Silver nitrate 和Sulfadiazine不同，Sulfadiazine Silver僅對細胞膜，細胞壁作用而產生抗菌效果。又Sulfadiazine Silver 之化學性質非炭酸酶抑制劑，不會引起全身性酸中毒。

成份：每 Gm 含有：

Sulfadiazine Silver.....10mg

適應症：

局部預防及治療二級、三級燒傷的傷口化膿。

用法用量：

灼傷治療時1日1~2次。

先清潔患處後，以無菌之手套塗敷本劑，患部必須塗佈完全並達(2~3mm)厚，在塗敷本劑後不必馬上裹上紗布，第二天將前一日的乳膏清潔或以溫水洗掉，再繼續塗敷治療。使用本劑應繼續直到出現治療效果，以免患部未完全痊癒，會有再感染之可能，其他一般感染症，以適量塗敷，每日一至數次。

注意事項：

1. 藥物反應症候(搔癢、發紅、腫脹、丘疹、小水泡)出現時，應中止使用。
2. 曾對礦胺藥過敏，光線過敏，肝或腎障礙之患者應慎重使用。
3. 若有過敏(發癢、發紅)菌交代症、白血球減少及皮膚疼痛等現象應中止使用。
4. 孕婦使用，應考慮有益性及危險性之比較。
5. 新生兒及早產兒，不推薦使用本劑。
6. 本劑與外用酵素製劑併用會減弱藥效，併用時應注意。
7. 廣範圍、大面積之使用場合，應定期測定血清滲透壓。
8. 本劑不可用於眼睛。
9. 應避光保存。

包裝：1000gm以下管裝、罐裝。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第032571號

G-1779號

cGMP



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website : <http://www.sinphar.com>

10-950-02