

lic Salic Salic S.2 ointments

(外用)

(用於)

"生達" 速立康 軟膏

Salic
Ointments
"Standard" (Salicylic acid)

速立康軟膏，其主成分 Salicylic acid，有軟化、溶解及剝離角質層的功能，故用於角化症及各種角化性皮膚炎等。

成 分：每Gm含有：

Salicylic acid.....25mg

作用特點：具有軟化、溶解及剝離角質層的作用。

適 應 症：去角質

用法用量：

清淨患部後，將本品適量塗擦於患部，每日1~2次。可先將本品塗抹於紗布後貼用，依症狀適宜增減之。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

1.患部化膿時所產生的糜爛，須事先處理後再使用。

2.須置於小孩接觸不到之處。

3.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

4.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。

5.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

6.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。

7.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

8.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

9.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

10.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

11.深部皮膚組織感染請就醫治療。

警 語：

1.對藥物各成分過敏者不得使用。

2.大範圍及長期使用會造成水楊酸效應（耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等）。

3.避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。

4.不要觸碰眼部、臉部、陰部、黏膜。

副 作 用：

紅斑、搔癢、刺痛感、水楊酸效應（耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等）。

貯 藏：

25°C以下，密閉容器貯之。

包 裝：

1Kg以下塑膠瓶裝及鋁管裝。

衛署藥製字第030530號 G-0804 Code No. OS-04

3216130

193091



GMP藥廠 · ISO 9001
生達化學製藥股份有限公司二廠
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台灣省台南縣新營市開元路154號