



4104A

“景德”安比西林膠囊

Ampicillin Capsules

500mg “Kingdom”

本品 Ampicillin 是一種廣效新的半合成青黴素，其抗菌範圍很廣，對青黴菌 G 有感受性的革蘭氏陽性菌有效外，對大部分易致病的革蘭氏陰性菌亦有效，因 Ampicillin 具對革蘭氏陰性菌之殺菌力，使它補助了 Penicillin G 對此之不足，而成爲青黴素群之最優良者，其殺菌範圍包括：

革蘭氏陽性菌：無青黴素酶葡萄球菌、肺炎雙球菌、溶血性和非溶血性鏈球菌、梭菌屬，以及大多數的腸球菌。
革蘭氏陰性菌：淋病奈氏菌、腦膜炎奈氏菌、流行性感嗜血菌、帶狀桿菌、奇異變形桿菌，以及許多沙門氏菌、志賀氏菌和大腸菌。

Ampicillin 在酸性液中安定，口服後極易被吸收，服用後兩小時，可達血中最高濃度，故能發揮最高療效。藥效可持續 6 小時服用劑量 30~40% 由尿中排出。

成分：每粒膠囊含

Ampicillin 500 mg (力價)

適應症：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

作用於：

全身感染症：由葡萄球菌、鏈球菌、肺炎菌等革蘭氏陽性菌及大腸桿菌沙門氏菌、變形桿菌等革蘭氏陰性菌所引起者。

呼吸道感染症：肺炎、支氣管炎、膿毒性喉痛、咽頭炎。

泌尿道感染：由大腸桿菌、變性桿菌、糞鏈球菌所引起者，如尿道炎，膀胱炎，腎盂腎炎。

淋病：由淋菌所引起者。

胃腸道感染症：由沙門氏菌、志賀氏菌、大腸桿菌等引起者如傷寒、下痢、腸炎。

腦膜炎：由腦膜炎球菌、嗜血流行性感嗜、大腸桿菌所引起者。

用法用量：成人每 6 小時服用一次，每次服用一粒，小孩每公斤體重每日 25~50 mg，每 6 小時平分服用一次。嚴重感染者量可酌增，宜於飯前半小時至一小時服用。
本品須由醫師處方使用。

- 注意事項：1. 如有過敏現象，則不宜使用。
2. 本劑因被青黴素酶不活化，凡產生青黴素酶之細菌感染症，皆不適用。
3. 治療期間，應定期作肝、腎臟及造血機能檢查。
(尤其兒童及嬰兒應用本品時)

包裝：1000 粒以下瓶裝及鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 017859 號
Code No. 17859

景德製藥股份有限公司

廠址：台北縣土城市中央路二段 104 號