

“信東” **安寶** 注射液10公絲／公撮（鹽酸立特林）

**Anpo Injection 10 mg/ml (Ritodrine Hydrochloride)**

“信東” **安寶** 錠10公絲（鹽酸立特林）

**Anpo Tablets 10 mg (Ritodrine Hydrochloride)**

安寶是一種口服、肌肉及血管注射均有效的子宮鬆弛劑。它可抑制子宮收縮的頻率與強度。

【化學組成】

安寶的有效成分是鹽酸立特林（Ritodrine Hydrochloride），其化學名稱爲：  
Erythro-p-hydroxy- $\alpha$ -[1-[(p-hydroxyphenethyl)amino] ethyl] benzyl alcohol hydrochloride。

【成分】

藥品名稱	規格	每單位含量
Anpo Injection 10 mg/ml (Ritodrine Hydrochloride)	10ml	100mg
Each ml contains:		
Ritodrine Hydrochloride		10mg
Anpo Tablets 10 mg (Ritodrine Hydrochloride)	100	1000mg
Each tablet contains:		
Ritodrine Hydrochloride		10mg

【適應症】

預防早產、流產。

【用法·用量】

早產：

靜脈輸注：

一發現症狀立即開始，初劑量爲0.05mg/minute，按其效果每10分鐘漸增加0.05mg/minute的劑量，直至達到預期的效果爲止，有效劑量通常在0.15mg/minute與0.35mg/minute之間，當子宮收縮停止後，此輸注必須再繼續12~18小時。

肌肉注射：

如果無法靜脈輸注，需改用10mg肌肉注射，如果仍無法達到預期的效果，1小時內可再重覆一次10mg，接著每2~6小時給予10~20mg，繼續12~48小時，視其反應及副作用情形，劑量可予以增減。注射後以口服維持劑量每2~6小時1錠，視其反應及副作用情形，增減劑量。

口服維持治療：

在靜脈輸注治療終止前30分鐘左右開始口服治療，最初24小時口服維持劑量是120mg，即每2小時給予1錠（10mg）。此後每天的一般劑量維持在80~120mg之間，只要醫師認爲必要，口服可以繼續。

本藥注射劑限由醫師使用，口服製劑須由醫師處方使用。

【禁忌症】

- ① 陰道大量出血。
- ② 任何延長懷孕期對產婦或胎兒能造成危害者。
- ③ 產婦的心臟病。
- ④ 絨毛羊膜炎（Chorioamnionitis）。

【副作用】

劑量適當時，Ritodrine耐受性很好，特別當病人保持側臥，按所述之用法服用時，絕無低血壓的情況，需要停藥的情形很少見。產婦的脈搏速率會上升，通常不甚嚴重，也可能導致心悸。靜脈輸注Ritodrine時引起的心跳加速，當減量或停藥後會立刻恢復正常，產婦的心跳加速是否予以考慮依各情況不同，但是對健康的病人，心跳速率避免超出140。潮紅、出汗、顫抖、噁心及嘔吐少數病例會發生，如果使用過量，可以 $\beta$ -交感神經解除劑當解毒作用來矯正。

【注意事項】

- 近期文獻報告提出同時併用Betamimetics及Corticosteroids曾有引起母體肺水腫現象，使用時須謹慎監視。
- 由於對糖尿病人使用經驗不足，因此需特別小心避免併發症。使用的第一天，病人胰島素需要量會改變，需特別注意。
- 動物試驗結果顯示，即使用高劑量的Ritodrine也不會使胎兒畸形，然而由於對人體研究資料有限，所以Ritodrine不宜在懷孕的前16星期使用。
- 決定使用Ritodrine治療前，應仔細小心篩選患有潛在性心臟病危機病人。
- 靜脈輸注治療時，每15分鐘需注意察看一次血壓、脈搏及胎兒心跳速率。
- 病人情況安定後，每1~6小時仍需檢查一次，有酸中毒情形時更應連續察看。
- 為了預防由腔靜脈綜合症狀所引起的低血壓，病人施行靜脈輸注時需側臥。

【附 記】

- 如果羊膜已破裂或子宮頸已張開超出4公分，則作用微弱。

【立特林靜脈注射劑量表】

由下表可以找出Ritodrine所需劑量之(1)使用劑量(2)輸注速率。輸注速率可用輸注幫浦或滴速來調整。輸注液以等滲壓之葡萄糖溶液較適宜：

需要的 Ritodrine 劑量 mg/minute	每 500 ml 輸注液 所需劑量 (mg)	輸 注 速 率 drops/minute
0.15	100	15
0.25		25
0.35		35
0.40		40
20 滴相當於 1 ml 輸注液		

【包 裝】

- 2、5公撮／安瓿，100支以下裝。
- 2-1000錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

【貯 存】

應存放於0~30℃

Anpo Injection 10mg/ml 衛署藥製字第037126號G-3956  
(Ritodrine Hydrochloride)

Anpo Tablets 10mg 衛署藥製字第037196號G-3999  
(Ritodrine Hydrochloride)



信東生技股份有限公司  
桃園市介壽路22號