

利尿降壓劑
泌排特[®]錠
Behyd[®] Tablets
ベハイド錠

「泌排特」是心、腎、肝、內分泌、營養性、神經性等障礙引起之浮腫，對於水份及Na⁺有強制排泄療效，而同時產生血壓降下作用，又與易引起直立性低血壓，便秘，口渴，視力障礙等副作用之神經節遮斷劑或與會引起精神抑鬱，嗜眠，鼻塞之 Reserpine 等藥劑併用時，可減少其副作用，並可減少上述藥劑之用量。

「泌排特」之合成法是日本杏林獨創並獲世界專利之產品。

【成份】

每錠含有：

Benzylhydrochlorothiazide 4mg

【藥理作用】

○利尿作用

「泌排特」對於重碳酸鹽，K⁺之喪失極少，故反覆使用也不攪亂體內電解質之平衡，而且兼備水銀利尿劑與碳酸脫水酵素抑制劑之作用，鹽類排泄效果較 hydrochlorothiazide 強約6倍。增加 Cl⁻之排泄，但尿之PH則無變化。

○血壓降下作用

「泌排特」係抑制細尿管之Na⁺吸收，使ATP-ase不活性化，而強化血管壁，減低血壓。

【適應症】

利尿，高血壓。

【用法用量】

成人一天2次，一次1~2錠，視年齡症狀輕重而酌量之

維持量以一週2~3次間歇投與。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1.一般注意：

(1)因本劑之利尿效果顯著，從少量開始服用，再徐徐增量。

(2)連續服用時，需定期檢查電解質是否失調。

2.禁忌：

(1)無尿及急性腎不全之患者。

(2)體液中鈉、鉀明顯缺少之患者。

(3)以往對Thiazide系藥物及類似化合物(如chlortalidone等sulfonamide衍生物)有過敏症之患者。

3.慎重使用：

(1)肝硬變之患者(引發肝性昏睡)。

(2)高齡心疾患者，嚴重冠狀動脈硬化症及腦動脈硬化症之患者。

(3)嚴重腎障礙之患者及肝疾患、肝機能障礙之患者。

(4)本人或家屬有痛風、糖尿病之患者。

(5)下痢、嘔吐、高鈣血症、副甲狀腺機能亢進症之患者。

(6)服用Digitalis，糖質副腎皮質Hormone劑及ACTH之患者。

(7)交感神經切除後之患者。

4.副作用：

(1)血液：極少例有血小板減少，白血球減少，再生不良性貧血，紫斑等現象出現時，中止使用。

(2)肝臟：極少例有肝炎出現。

(3)代謝異常：有低鈉血症，低鉀血症，血中鈣上昇等現象出現，有高尿酸血症，高血糖症出現時，應減量或停藥。

(4)過敏症：有出現斑疹，顏面潮紅或對光線過敏時，應中止使用。

(5)消化器：偶而出現食慾不振，噁心、嘔吐、胃部不適、下痢、便秘，極少例有胰臟炎、唾液腺炎。

(6)精神神經系：偶而有眩暈，極少例有知覺異常現象。

(7)眼：極少例有霧視、黃視症。

(8)呼吸器：間質性肺炎、肺水腫。

(9)其他：偶而有倦怠感，極少例有全身性紅斑性狼瘡，肌肉痙攣。

5.孕婦、哺乳婦之使用：

Thiazide系藥物，易使新生兒血小板減少，故對懷孕末期及哺乳中之婦女，應避免使用。

6.乳兒之使用：易產生電解質不平衡，應慎重使用。

7.相互作用：

與下列藥品併用時，需慎重使用：

(1)含Ethanol飲料(會增強起立性低血壓)。

(2)Norepinephrine等Catecholamine(會使血管壁反應性低下)。

(3)與其他降壓劑併用時，應注意調整其用量。

(4)Digitalis(會增強對心臟作用)。

(5)糖質副腎皮質Hormone劑，ACTH(會放出過多的鉀)。

(6)糖尿病用藥(會減弱糖尿病用藥之作用)。

8.臨床檢查值之影響：

會使非甲狀腺障礙患者血清之PBI值低下。

9.其他：需夜間休息之患者，為避免夜間利尿，請於午前使用。

10.避光保存。

【包裝】

100's, 500's盒裝

100's, 500's, 1000's瓶裝

Code No.



衛署藥製字第010917號



日本杏林製藥株式会社 授權



杏林新生製藥股份有限公司 製造

桃園縣龍潭鄉三和村店湖一路237號

電話：(03)470-3248・470-3249