



“永豐” 萬博黴素 懸液用粉50公絲/公撮
(安莫西林)

AMOLIN powder for oral suspension
50mg/ml (Amoxicillin)

本品對革蘭氏陰性及陽性菌，具有直接的殺菌作用，為一廣效性半合成青黴素衍生物之口服劑製劑。

成分 Each ml contains: Amoxicillin (as Trihydrate) ... 50mg (Potency)

作用 本品Amoxicillin可經由細菌胞壁之mucopeptide生成成之抑制，而對活性繁殖期之感受性細菌有殺滅作用。

本品具易溶性，且安定性高，尤其在酸性液中非常安定，口服吸收良好，吸收速率比Ampicillin快，並可迅速在血中達到最高濃度。(約較等量之Ampicillin高2倍)

口服半小時內即可達到有效治療濃度。於6小時之內約口服量的60%自尿排出體外。如同時服用Probenecid，則在腎臟功能正常病人身上，其血中濃度增高，排泄會遲延。

毒性低，副作用小，長期服用不致產生抗藥性。

適應症 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量 通常成人每次250mg(Potency)，一日3~4次。小兒劑量，一日量20~40mg(Potency)/kg分3~4次口服。依年齡、症狀之輕重適當增減劑量。

本品使用前加水稀釋至容量，60ml瓶裝加到60ml，500ml瓶裝加到500ml，搖勻後每ml含Amoxicillin Trihydrate 50mg (Potency)。

本藥須由醫師處方使用。

副作用 1. 胃腸道：噁心，嘔吐，瀉痢。
2. 過敏反應：紅斑性斑及丘疹、蕁麻疹。



3. 肝臟：S-GOP會稍有升高，意義不明。
4. 血液及淋巴系統：在penicillin治療中，有下列報告：
貧血、血小板減少、血小板減少性紫斑、嗜伊性紅血球過多、白血球減少、顆粒性白血球缺乏，上述反應被視為過敏現象，停藥後即復原。
5. 中樞神經系統：可逆性之過敏，極少數報告有精神激昂，焦慮，失眠、精神混亂、行為改變或眩暈現象。

配合禁忌 對penicillins有過敏紀錄者。

- 警告事項**
1. 在penicillin治療中，曾有嚴重過敏及致命之過敏反應報告，口服penicillin之患者亦曾發生過敏現象，對多發性過敏者，更會發生。
 2. 對Cephalosporin有過敏者，在penicillin之治療過程亦有過敏紀錄。
 3. 在服用本藥前，應先注意對penicillin，Cephalosporin或其他過敏原，如有過敏發生，應先停藥並以其他藥品代替。
 4. 嚴重過敏反應，需即以Epinephrine，Oxygen或steroid及暢通呼吸治療，包括插管等。
 5. 在以抗菌劑，包括Amoxicillin之治療，曾有偽膜性結腸炎發生之報告。
 6. 輕度之偽膜性結腸炎，通常停藥即可；中或重度者，需以流體及電解質，蛋白質補充劑，且以臨床上對C difficile Colitio有效之抗菌劑治療。
 7. 用於孕婦，本藥對妊娠之安全性尚未建立。

- 注意事項**
1. 與其他強力藥物長期治療時，需定期評估腎、肝及造血機能。
 2. 治療期間與抗黴菌劑或抗菌病原可能引起重感染，如重感染發生，應即停藥，並以適當之治療代替。

包裝貯存 1,000公克以下玻璃瓶裝。

本品應保存於冷暗處。加水重組後，冷藏於冰箱，使用期限：七天。使用前應加以搖勻。

衛署藥製字第041628號G-5988