

“東洲”安血平 注射液 20 公絲/公撮 (亥瓜拉任)  
**APRELAZINE Inj 20mg/ml (Hydralazine)**

本品直接作用於中腦之血管運動中樞 (Vasomotor Center)，使末梢小動脈擴張，增加腎血流量，減輕腦血管之緊張，而使血壓穩定下降，本品靜脈注射後於 15~20 分鐘出現藥效，本品不會像一般降壓劑引起起立性低血壓現象，可避免因低血壓所引起之身體傷害，如暈厥，腦部損傷，故可用於治療各類型高血壓急症，如子癇，高血壓性腦症。

【成分】

Each ml contains:

Hydralazine Hydrochloride.....20mg.

【適應症】

高血壓。

【用法·用量】

成人通常每次 20~40mg，肌肉注射或緩慢靜脈注射，如有必要，可反覆使用，點滴注射時應以生理食鹽水或 Ringer 溶液稀釋使用，但不適合以 Dextrose 溶液稀釋。

【本藥限由醫師使用】

【禁忌症】

- (1) 對 Hydralazine 過敏之患者。
- (2) 冠狀動脈疾患 (coronary artery disease) 及風濕性僧帽瓣心疾患之者 (mitral valvular rheumatic heart disease)
- (3) 頭蓋內出血急性期之患者。

【注意事項】

- (1) Hydralazine 於大劑量長期使用時，可能引起全身性紅斑狼瘡，風濕性關節炎，皮膚反應，發熱，但在不超過 200mg/day 之推薦劑量下，很少發生，如有發生，只需減量或停藥，即可消除，嚴重時則需以 steroids 適當治療。
- (2) 對於服用 MAO inhibitors 或 Tricyclic Antidepressants 之病人或麻醉下之病人，為避免發生低血壓，應小心使用。
- (3) Hydralazine 與其他注射用降壓劑如 diazoxide 一起使用時，須小心觀察血壓是否過度降低，因此二種注射劑合併時，偶而會發生血壓過低之現象。
- (4) 於動物試驗時，曾發生口蓋裂等異常胎仔之摧畸形報告，雖然對於人類尚未有此種摧畸形之報告，但對於妊婦或可能有妊娠之婦女，應對酌其利弊，謹慎使用。
- (5) 對於過去曾有冠狀動脈疾患，僧帽瓣心疾之患者及甚機能障害之患者，腦血管障害之患者，應謹慎使用。
- (6) Hydralazine 雖亦可能引起姿勢性低血壓，但較神經節遮斷劑為少。
- (7) 於大劑量長期使用時，應定期作血液檢查，因 Hydralazine 於大劑量長期使用時，可能引起血液惡病質，如血紅素減少，紅血球減少，白血球減少，顆粒球減少，如有此種現象發生，應中止投與。

【副作用】

Hydralazine 引起之副作用通常可因降低劑量而恢復正常，有一些則需停藥才能恢復正常。

(較常見之副作用) 頭痛、心悸、噁心、嘔吐、食慾減退、心跳加速。

(較少見之副作用) 鼻充血、潮紅、流淚、結合膜炎、感覺異常、眩暈、震顫、肌肉痙攣、精神抑鬱、焦慮、過敏、便秘、排尿困難、血液惡病質。

【包裝】

0.5ml×10A	0.5ml×50A	0.5ml×100A
1ml×10A	1ml×50A	1ml×100A
2ml×10A	2ml×50A	2ml×100A



**Oriental**

東洲化學製藥廠股份有限公司

ORIENTAL CHEMICAL WORKS, INC.

台北縣蘆洲市中山二路195巷12號

電話：(02) 2281-5252(四線)

傳真：(02) 2281-8282