

美必定注射液

Bipiden Injection

【成份】：Each mL contains:

Biperiden lactate.....5mg

【適應症】：

帕金森氏症。

【說明】：

1. 帕金森氏症群，特別是對抗肌肉僵硬和振顫。
2. 錐體束外症狀：早期運動困難，靜坐不能，精神鎮靜劑和類似作用藥物引起的類帕金森氏症。
3. 尼古丁解毒劑。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

治療由小劑量開始，然後逐漸增加劑量，一般依據治療效能和副作用而定。於小孩主要用於藥物引起的緊張不足(例如neuroleptics, meloclopramide和同種的化合物)。

於老年病人應注意其使用量，尤其是有器質性腦疾病者。

帕金森氏症：

嚴重情況之初劑量：肌肉和慢速靜脈注射，一天10-20

mg。

藥物誘發的運動障礙：

為獲得快速的療效，成人可單劑量肌肉或慢速靜脈注射2.5-5mg，若有需要30分鐘後可再重覆注射相同劑量，一天最大之劑量為10-20mg，一歲以下小孩每次1mg，6歲以下每次2mg，10歲以下每次3mg，若有需要30分鐘後可再重覆注射相同劑量。

尼古丁解毒：

急性尼古丁中毒，肌肉注射5-10mg，危急情況則靜脈注射5mg。

【禁忌症】

凡窄角性青光眼，胃腸道狹窄，巨結腸者禁用本藥，患有前列腺疾患且可能引發危險性心搏過速者亦禁用本藥。

孕婦與授乳婦之使用：

無致畸胎之證據，但使用於孕婦應特別注意，尤其是懷孕首三個月。抗膽素激導性劑會抑制泌乳，然Bipiden目前尚無這面資料。本品會進入乳汁，其濃度相當予母體血漿之濃度，因為我們尚不知道本品對新生兒之代謝情形和藥理毒性方面作用，通常建議停止授乳。

【副作用】

中樞神經副作用有疲倦、眩暈和嗜睡，高劑量給藥會有不安靜和紊亂現象，偶有記憶力損害，極罕見產生幻覺。周邊神經副作用包括口乾、調節障礙、汗過少、便秘、胃不適和心跳加快，極罕見心跳減慢。腸外給藥可能發生血壓下降。偶有過敏性皮疹和運動困難。有少數病例，尤其是患有前列腺腺瘤病人，服用Bipiden會造成排尿困難，必須減少劑量，極少數會造成尿滯留（拮抗劑：Carbachol）。

【交互反應】

本品與抗膽素激導性精神科藥物、抗組織胺劑、抗帕金森氏藥和解痙劑併用會加強中樞神經系和周邊副作用。與quinidine併用會加強抗膽素激導性作用（特別是AV傳導）。同時給予levodopa和Bipiden會加強運動困難。於用Bipiden治療期間，飲酒會加強酒精作用。Meloclopramide和與該品類似作用在胃腸道之化合物會被Bipiden所拮抗。

【警語】

副作用通常發生治療之早期或是劑量增加太快時，除非是發生致命的併發症通常不能突然斷藥以免造成過多抗調節之危險。患有大腦血管硬化之老年人，即使用治療範圍的劑量也可能引起敏感。

Bipiden與其他中樞作用之藥物，抗膽素激導性劑，酒精併用會影響駕駛和操作機器之能力。

【包裝】

1毫升安瓿裝，100支以下盒裝。

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市新民路128號