


施 德 素 膠囊250毫克

Supercillin Capsules 250mg

本品主成分Amoxicillin為青黴素之衍生物，是一半合成之抗生素。對革蘭氏陽性及陰性細菌有廣效性殺滅功效，其化學結構式為：



主 成 分：施德素膠囊250mg

每膠囊含：Amoxicillin.....250mg (Potency)

適 應 症：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌所引起之感染症。

藥理作用：1. Amoxicillin對活性繁殖期之感受性微生物之殺滅作用，主要是經由細菌細胞壁之Mucopeptide生合成之抑制所達成。

2. Amoxicillin在胃酸存在下仍甚安定，服用時不必考慮膳食因素。口服後迅速吸收，且易於擴散到大部份身體組織與體液中，但腦部及脊髓液之穿透則只在腦脊髓膜發炎時發生。

3. Amoxicillin與Ampicillin相同劑量下，其產生之血漿尖峰濃度高達Ampicillin之兩倍。

4. Amoxicillin的半生期約為61.3分鐘。口服劑量中有60%，注射劑量中有75%在六小時內以未變化之原型排泄於尿液中。當與Probenecid同時使用時排泄會遲延。

5. Amoxicillin大約有20%是與蛋白質結合，它不是高度蛋白質結合之藥物。

6. Amoxicillin對Streptococci及Salmonella Spp之效力比Ampicillin稍高，但對Shigella Spp則略低。

7. Amoxicillin屬於青黴素酶敏感性之青黴素，對於會產生青黴素酶之細菌無效。

注意事項：1. 對任何其他青黴素、青黴素衍生物或Cephalosporins有過敏反應之病人，對本品亦會引起過敏反應。

2. Amoxicillin對孕婦之影響未獲定論，應就其使用上之危險與效益加以考慮。

3. Amoxicillin會排泄於乳汁，哺乳母親使用時應就其危險與效益加以考慮，因為可能會使嬰兒過敏。

4. Probenecid與本藥同時會減低本藥之腎小管分泌，使其血中濃度及/或毒性升高及延長。

5. 制菌劑如四環素會干擾在腦膜炎或其他需要迅速殺菌效應之情況下的殺菌效力，最好避免同時使用。

6. Amoxicillin 會使 SGOT 升高而干擾診斷試驗。
7. 如有下列醫療問題存在時，本藥之使用應加留意：
 - (1) 曾患一般性過敏反應（氣喘、濕疹、枯草熱及蕁麻疹）。
 - (2) 嚴重腎功能受損。
8. 如有下列副作用時應加留意：蕁麻疹、發癢、紅疹或哮喘（過敏反應）。如有腹瀉、噁心及嘔吐持續發生時亦應留意。
9. 使用本品治療時，對 Amoxicillin 無效之微生物會過份生長。
10. 對 A 組 β - 溶血性鏈球菌感染之治療至少應持續十天，用以協助防止急性風濕熱之發生。
11. 除腎功能嚴重受損外，一般腎功能不良者通常不需減少劑量。

用法·用量：

本藥須由醫師處方使用。

一般成人劑量：口服，每8小時1~2粒，一天最高限量為18粒(4.5g)。

【注意】淋病治療時，以本品12粒與1g Probenecid 作單劑量服用。

一般兒童劑量：體重6公斤以下嬰兒—口服，每8小時25~50mg。
體重6~8公斤嬰兒—口服，每8小時50~100mg。
嬰兒及體重8~20公斤幼童—口服，每公斤體重6.7~13.3mg，每8小時一次。
體重20公斤及20公斤以上幼童—同成人一般劑量。

【注意】依重量基礎計算之劑量，有些嬰兒及幼童會大於成人劑量，但其每日總量不得超過成人劑量之限量。

包裝·儲藏：

1. 本品應包裝於緊密容器，貯於陰涼（15~30°C）乾燥處所。
2. 6-1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第010819號



榮民製藥股份有限公司

Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.
中壢市中山東路三段447號

404161013