

本劑含0.05% W/W Clobetasol propionate，為一腎上腺皮質類固醇製劑，具有強的抗炎和血管收縮作用，可用於治療牛皮癬(不包括廣泛性的斑狀牛皮癬)，頑強的濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡及其他對較溫和藥效之類固醇無理想反應的皮膚病症。

【成份】 每gm含：Clobetasol propionate0.5mg

【適應症】 牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

【用法用量】 每日1~2次，輕擦於患部。情況改善後即應停止用藥。

治療超過四週後若未再複診則應停止治療。

【注意事項】

- 1.儘可能避免長期持續治療，尤其是嬰兒及孩童。若使用於孩童，則建議應每週複診。
- 2.長期大量治療下，臉部通常較其他部位可能發生萎縮性變化。
- 3.塗敷本劑於眼皮時應小心，避免讓藥物進入眼睛以免可能造成青光眼。
- 4.使用於牛皮癬的患者須小心注意：可能的危險性包括反激性復發，抗藥性的產生，廣泛的膿疱性牛皮癬以及因皮膚屏障功能受損而引起的局部或全身毒性。
- 5.若患部發生感染則應使用適當的抗黴菌療法，倘有任何廣泛性的感染應停止使用本劑而服用全身性抗黴菌製劑。
- 6.封閉包紮會造成溫濕的情況，而促使產生細菌感染。因此包紮之前必須將皮膚清洗乾淨。
- 7.動物試驗顯示使用局部腎上腺皮質類固醇會有畸胎作用。此發現與人類之關連性尚未建立。但孕婦不得大量或長期使用本劑。
- 8.發生過敏現象時應立即停藥。

【副作用】

- 1.長期大量使用於廣泛部位會造成全身性的吸收，產生腎上腺皮質機能亢進現象。尤其是使用在嬰兒、孩童、及封閉包紮情況。
- 2.長期密集使用會造成皮膚的局部萎縮性變化，如皮膚變薄、產生皺紋及表皮血管的擴張。
- 3.極少數發現使用腎上腺皮質類固醇(或停藥後)可能會引起病灶產生膿疱。

本藥須由醫師處方使用。

委託者：科華生技醫藥股份有限公司

【貯藏】 貯存於25°C以下。

地址：臺北市內湖區民權東路六段180巷6號8樓之11

【包裝】 1000毫升以下鋁罐裝。

製造廠：仙台藥品工業股份有限公司

廠址：台南縣新營市工業區新工路35號


衛署藥製字第049063號

總經銷商：台田藥品股份有限公司

地址：台北市南京東路五段108號11樓


電話：02-27568555

【可易適泡沫液使用步驟】




搖動

使用前請先握緊瓶身搖動數次，使裡面的液體及氣體充分混合




壓出

倒置瓶身輕微按壓出適量的泡沫於所付的透明瓶蓋內，或者您也可用乾淨低溫的碟子盛裝，但是不要直接將泡沫噴在手上或身體其他部位，因為泡沫會因體溫逐漸溶解，如果噴出的泡沫呈現流體水狀，這表示存放產品的地方溫度過高，請將鋁罐放入冰箱冷藏室數分鐘後再取出使用即可



塗抹

以手指取適量的泡沫，將泡沫塗抹於皮膚患處，需要時並輕柔按摩，重覆同樣的步驟直到皮膚都接觸到泡沫為止



乾燥

塗抹完請清洗雙手，如有未用完的泡沫建議丟棄不用，所有產品均不需沖洗