



“瑞士”

瑞丹 錠2毫克 (崙和費定)

Switane Tablet 2mg "SWISS" (Trihexyphenidyl)

本品為帕金森氏症候群 (Parkinson's disease) 治療藥，其末稍作用，可直接作用於副交感神經，並使平滑肌舒弛。能有效降低肌痙攣僵直，緩解帕金森氏症特有的精神無力症及抑鬱。與其他的治療帕金森氏症藥物比較：本品副作用較小，如：散瞳等作用，較Atropine弱且服用本品所產生的不適感較服用癩茄類藥物的小。

⊕成份：Each Tablet Contains:

Trihexyphenidyl Hydrochloride..... 2.0mg

⊕適應症：帕金森氏症候群。

⊕用法用量：

1. 帕金森氏症：服用第1天初劑量1mg，每3-5天增加2mg，至每日6-10mg分3次服用，餐時服用(會口乾者宜飯前服用，老年人宜飯後服用)。
2. 藥物誘導帕金森氏症：1日總劑量為5-15mg，開始投與劑量由1mg起，當症狀無法改善時，適量增加至病情獲得控制。
3. 腦炎後帕金森氏症：平均每日總劑量為12-15mg。
本藥須由醫師處方使用。

⊕副作用：神經質、不安、失眠、口乾、視力模糊、輕微噁心、小便困難、低血壓、甚至引起毒性神經病變及青光眼。

⊕注意事項：

1. 下列患者禁用本品：心臟缺氧、休克、遲發性運動困難之患者。
2. 血管硬化症者或有其他藥物過敏之患者，服用本品易產生精神不安等副作用，故此類患者服用本品的初劑量應降低。
3. 若有嚴重反應發生，則暫停用本品數天，以後再以較小劑量重服用。
4. 本品必須經年服用，故患者需予長期觀察，高血壓、心臟病、肝臟病、腎臟病患，使用本品應予妥善看護，慎重投與。

⊕包裝：2-1000錠 / 塑膠罐裝，鋁箔盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台南縣永康市四維街164號