

“福元”美克旅鎮 錠 25毫克

Meclizine HCl Tablets 25mg “F.Y.”

醫師藥師藥劑生指示藥品

內衛藥製字第004781號

【成份】每錠中含有：

Meclizine Hydrochloride .....25.0 mg

【適應症】

預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【用法用量】

預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前30 ~ 60分鐘服用之。成人1次2錠，一天服用一次，12歲以上適用成人劑量；12歲以下之兒童，使用前請洽醫師診治，不宜自行使用。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥為保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請洽醫師藥師藥劑生。
5. 不得併服含酒精飲料。
6. 服用本藥若有不了解之處，請洽詢醫師藥師藥劑生。

【警 語】

1. 服用本藥後，可能引起思睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)，老年人應小心使用本藥，如症狀持續加強，宜停藥就醫。
2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎病患者不得服用。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - (1) 12歲以下不建議自行使用。
  - (2) 曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。
4. 下列病患使用鎮暈藥劑，應詢問醫師藥師藥劑生：
  - (1) 接受醫師治療並服用藥物者。
  - (2) 大於65歲以上者。
  - (3) 本人或家族具過敏體質者。
5. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能亢進、腎臟病者不得服用。
6. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑、安眠劑及其他含有抗組織胺成分之內服製劑(如其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。
7. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難，請勿服用此藥。
8. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿開車或操作危險器械。
9. 如發生皮膚發疹、發紅、癢疹、腫痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、搖動、不安定感、口乾、便秘及下痢等症狀時，請停止服用，並持藥品包裝及說明書，詢問醫師藥師藥劑生。

【儲存條件】請儲存於密閉容器、25°C以下避光處所，且於期限內使用。

【包裝】1000錠以下塑膠瓶裝。

LTT069

福元化學製藥股份有限公司

台北縣瑞芳鎮大寮路95-1號