



安博黴素[®]注射劑 500公絲

AMPOLIN[®] Injection 500mg

安博黴素注射劑一種新的廣泛性合成 Penicillin 製劑，不但對革蘭氏陽性菌有顯著療效，同時對革蘭氏陰性菌亦有效，為一種療效正確之卓越注射用抗生素製劑。

成分 每小瓶含有：
Sodium Ampicillin 500mg(力價)

特點 以IM方式使用時，易達到血中最高濃度，且保持時間長久，約可達6小時。

適應症 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他對青黴素具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量 通常成人一回 250~500mg 一日 2~4 次肌注，小兒體重在 20kg 以下，以 25~60mg(力價) / kg(一日量)計算，分 3~4 次肌注或靜注，限由醫師使用。依年齡、症狀、劑量加以適當增減之，下列用法用量可供參考。

呼吸道、皮膚及軟組織感染方面

如：肺炎、支氣管炎、膿毒性咽喉炎、喉炎、中耳炎、膿皮症及皮膚感染症、外傷感染症、丹毒、淋巴管炎、蜂窩組織炎。

成人：250~500mg 每 6 小時注射一次。
小孩：體重 50kg 以下，每日 25~50mg / kg 計算，分成四次，每 6 小時注射一次。

泌尿生殖感染症方面

如：尿道炎、產褥膿毒病、淋病。

成人：250~500mg 每 6 小時注射一次，每日四次。
小孩：體重 40kg 以下者，一日量以 25~50mg / kg 計算，分成四次，每 6 小時注射一次。

由 N. Gonorrhoea 感染引起之尿道炎

成人：500mg 每 12 小時注射一次。

細菌性腦膜炎

成人：8~14gm / day。以 I.V. 點滴治療之。

小孩：100~200mg / kg / day。

此類以 I.V. 點滴方式給藥，併以每 3~4 小時用 I.M. 方式給藥。

注意事項 有 Penicillin 過敏症前歷之患者不宜服用本劑。
 在治療中有非感受性微生物 (Aerobacteria aerogenes, pseudomonas, candida) 之過度繁殖症狀出現時，應立即停藥，改用適當之療法代替之。
 治療期間應定期作肝、腎及造血機能檢查(尤其是兒童及嬰兒)。

使用法注意

I.M. 肌注用

250 mg/vial 以注射用水 1.0 ml 溶解，500 mg/vial 以注射用水 1.8 ml 溶解，1000 mg/vial 以注射用水 3.5 ml 溶解，全部抽出，並須在一小時內用完。

I.V. 靜注用

250 mg/vial，500 mg/vial 以注射用水 5 ml 溶解，1000 mg/vial 以注射用水 7.4 ml 溶解，全部抽出，並須在 1 小時內用完。

I.V. 點滴用

Sodium ampicillin 溶於下列注射液，而用於 I.V. 點滴時，則其安定性往往有下列之變化(稀釋成 2 mg/ml 及 30 mg/ml)。

品名	時間	Activity 損失率
(1) Isotonic sodium chloride	8 小時	-10%
(2) 5% dextrose	4 小時	-10%
(3) 5% dextrose in 0.4% sodium chloride solution	4 小時	-10%
(4) 10% Invert sugar	4 小時	-10%
(5) M/6 sodium lactate solution (in 30mg/ml)	4 小時	-10%

包裝 500mg 小瓶裝/100支以下盒裝。
 衛署藥製字第001853號

永豐化學工業股份有限公司
Y F CHEMICAL CORP.
 新北市新莊區新樹路292號