

Perioxidin

T O O T H P A S T E

利口寧 藥用牙膏

口腔內之殺菌、消毒

衛署藥輸字第 025584 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

成分

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 0.12 g
BIOAVAILABLE EXCIPIENT q.s.f.100 ml
賦形劑: d-Panthenol, Vitamin E Acetate, Sorbitol, Silica Gel,
Glycerol, Cocamidopropyl Betaine, Polyethylene Glycol 400,
Hydroxyethyl Cellulose, Titanium Dioxide, Xylitol, Dentifrice
Aromatic Agent, Dimethicone, Mint Essence, Menthol,
Acesulfame Potassium, Sodium Saccharin, Methyl Salicylate,
Purified Water

牙菌斑是由食物殘渣、細菌和唾液所構成的相當細小的薄膜，如果平日不予去除，會附着在琺瑯質表面，攻擊牙齒結構，產生一連串造成牙齦發炎腫脹的物質。第一階段是牙齦炎(腫脹出血)，而接下來是觀察到牙周炎(齒槽膿漏)，會影響牙周韌帶和骨骼組織，甚至造成牙齒脫落、骨骼損壞。使用針對口腔內之殺菌、消毒的牙膏刷牙，可幫助減少牙菌斑。

適應症

口腔內之殺菌、消毒。

用法用量

Perioxidin 牙膏的用法和一般傳統牙膏相同：每日三餐飯後，每次一克。

副作用

當長期使用含 chlorhexidine 的產品，並接觸某些成分如茶、咖啡、酒和菸等，會造成牙齒表面變黃。顏色變化是表面的，藉由牙醫診所的潔牙技術即可輕易除去。長期持續使用可能產生暫時性的味覺改變。

注意事項

- (1) 僅限口腔衛生之牙膏用途。
- (2) 請勿放置在兒童視線所及與伸手可拿之處。
- (3) 請勿吞食。
- (4) 請存放於乾燥通風處。
- (5) 當有藥物過敏體質者，使用前先請教藥師、藥劑生、醫師、牙醫師。
- (6) 使用時請遵守用法及用量。
- (7) 小兒使用時，請保護者監督指導。
- (8) 使用數日後如症狀未改善，請中止使用或請教藥師、藥劑生、醫師、牙醫師。

貯存條件

本品之架儲期為 3 年(儲存溫度為在 25°C 下)。

包裝材質

鋁軟管裝。

製造廠：LACER, S.A.

廠址：C/Boters, 5, Parc Tecnològic del Vallès, 08290
Cerdanyola del Vallès- Barcelona, Spain.

藥商：元聖企業股份有限公司

地址：台北市民權西路 27 號 5 樓之 1