

通用藥審批制度



“國嘉” 和寧錠 0.5 毫克 (哈泊度)

Hopan Tablets 0.5mg “KOJAR” (Haloperidol)

本品係屬 Butyrophenone 的一種精神安定劑，具抗精神病效果 (抗幻覺、抗妄想、自律神經遮斷及錐體外路症狀) 之藥理作用。對 Phenthiazine 系無效的精神分裂病或躁病之興奮狀態等亦能奏效。

【適應症】躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

【用法用量】成人：初劑量每天 2-3 次，每次 0.5-2mg，假如治療效果不彰，而且病人耐受性很好，可視病人的反應而逐漸提高劑量。維持劑量：通常是每天 1-15mg。有時每天劑量需要 15mg 或是更多。可以考慮在短期間內服用更高的劑量，60mg 或是更多，但是這種高劑量只適用於健康情況良好的病人。

兒童：通常每 3 公斤體重服 0.1mg。初劑量：五歲以上：每天兩次，每次 0.5mg。五歲以下：每天兩次，每次 0.25mg。維持劑量：必要的話，劑量可以逐漸增加。如果治療失敗的話，則應在一個月以內停藥。

年老病患：初劑量：每天 2-3 次，每次 0.5mg。維持劑量：每天 2-3 次，每次 0.5-2mg。年老病患對於好度較為敏感，所以應該小心調整劑量。

本藥須由醫師處方使用。

【成份】
每錠含：
Haloperidol 0.5mg

- 【注意事項】
- 1、禁忌：
 - a. 昏睡狀態的患者及 Barbiturates 誘導體的中樞神經抑制劑的強力影響下的患者。
 - b. 重症心不全者。
 - c. 帕金森氏病者。
 - 2、慎重投與：
 - a. 肝障害患者。
 - b. 癲癇疾患及有此病歷者。
 - c. 甲狀腺機能亢進患者。
 - d. 對本品過敏患者。
 - 3、孕婦及授乳婦投與：

因會分泌至母乳中，及有催畸型之慮 (動物實驗) 所以授乳婦、孕婦及可能懷孕之婦人希勿服用。
 - 4、相互作用：
 - a. Barbiturates 誘導體及酒精會增強本品作用。

- b. Epinephrine 的作用逆轉、血壓降低，本劑投與中，請勿併用 Epinephrine。
- c. Carbamazepine 的併用會減弱本品作用。

5、其他：

本品投與中，開車及操作危險機械者須特別小心。

【副作用】

1. 循環器：血壓下降、心電圖變化（QT 間隔延長，T 波的變化）。
2. Syndrome malin：強度的筋強硬，嚥下困難、發汗、發熱，應停止用藥，水份補充等適當處理。
3. 錐體外路症狀：Parkinson 症候群（手指振抖、流口水等）。
4. 消化器：腸管麻痺，有止吐作用，可使其他原因所致之嘔吐不明顯。
5. 內分泌：女性型乳房、乳汁分泌、月經異常。

【警語】

1. 曾有精神病患以 haloperidol 治療而發生猝死、QT 波延長(QT-prolongation)及 torsades de points 之案例報告，尤其是比仿單建議更高的治療劑量和靜脈注射有較高的風險導致 QT 波延長和 torsades de points 發生。發生 QT 波延長、torsades de points 之高風險案例可能發生於無潛在危險因子之病患，但具有以下危險因子之病患必須特別注意，包括建議接受治療之前已有 QT 波延長情形之患者（包括電解質不平衡【特別是低血鉀及低血鎂】、使用已知會造成 QT 波延長之藥物、心血管疾病、甲狀腺功能低下、QT 波延長之家族病史）。倘若 haloperidol 以靜脈注射途徑給藥，應監測病患之心電圖，追蹤其 QT 波及心律不整之情形。
2. 「依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高」。

【包裝、儲存】

- 4-1000 粒瓶裝、鋁箔盒裝、室溫、遮光儲存。

【份 類】

：含錠類

Haloperidol

【注意事項】

：忌禁、

C-GMP



國嘉製藥工業股份有限公司
KOJAR PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

台中市大甲區幼獅工業區青年路 155 號
服務專線：(04)26816197