

泌得贊[®]錠 5 毫克

Glipizide Tablets 5 mg "CYH"

網號：C27

糖尿病主要由於胰島素活性之絕對或相對的不足，理想的治療為使胰臟分泌恢復到身體中正常活性的標準，且不過分刺激胰臟以免蘭氏小島發生功能性的衰竭，防護性的糖尿病治療法即藥物在活性與副作用間得到最可能確實的比例。本製劑為低劑量口服降血糖藥物，誘發胰島素以自然型態的分泌持續一段生理作用時期。

成分：

Each Tablet contains: Glipizide.....5mg

藥理作用：

利用動物做急慢毒性，腫瘤毒性，繁殖毒性試驗顯示毒性極低，無畸胎情形。腸道吸收迅速完全，分佈於血液，代謝迅速，服用後 24 小時內由尿中排出體外，無蓄積不良後果。直接作用於胰臟，刺激 β -細胞分泌胰島素且增進其對血糖變化的感性。

特點：

1. 活化胰臟 β -細胞功能促進胰島素分泌。
2. 吸收迅速，藥效穩定確保安全。此特性使產生最高治療效果與餐後發生的高血糖一致。
3. 對胰臟無不良後遺症，不會有長時的低血糖症的發生。
4. 排泄迅速無蓄積現象。
5. 具抗血脈病效應。有助降低粥狀性血液成分之含量(總脂量，膽固醇， α 與 β 的脂質蛋白比率)，控制糖尿病性血管疾病，改善受害器官的症狀。
6. 長期使用耐受性佳，腸胃無不良癥兆，血管無不良反應，心跳速率無變化。
7. 病患以他法治療無效時，可用本劑治療或注射胰島素兼口服本劑。
8. 治療活性與安全性間有最適當的比例。對特殊的治療劑量範圍易於調整。

適應症：

糖尿病。

用法與用量：

本藥須由醫師處方使用。

一般每日劑量 2.5mg 至 20mg(半錠至四錠)，按病情病況調整之。

1. 首度使用藥物降低血糖者：每日半錠或一錠，依病情需要漸增劑量，達完全控制效果。
2. 曾用其他口服降血糖藥劑者：由先前治療效果與病人臨床代謝狀況個別決定劑量，亦可初用低劑量再漸增至可控制病情為度，以 5mg(一錠)本劑代替從前口服降血糖劑一錠。

3. 接受胰島素治療者：使用胰島素病人不超過 30~40 單位者可以本劑取代之。若使用較高胰島素者，按臨床反應決定配合本劑使用，可減少胰島素的用量。

以上所述較高之每日劑量可分 2 至 3 次於飯前半小時內服用。

禁忌症：

本劑不能用於幼年型糖尿病，併發性酮酸血症，高血糖昏迷，併發性壞疽，嚴重肝腎機能不良，急性感染疾病，嚴重外傷，妊娠，外科手術以及缺乏胰島素的糖尿病。

注意事項：

本類口服降血糖劑限用於無酮酸性糖尿併發症狀者。不能用於潛伏性糖尿病，疑似糖尿病者。病人同時使用抗凝血劑 Phenylbutazone 與其衍生物，氯絲菌素，水楊酸鹽類， β -Adrenergic Blocking Agents，磺胺劑可能增進本劑的降血糖作用，而發生血糖過低情形。相反的，同時使用 Epinephrine，Glycocorticoids，口服避孕藥與 Thiazide 利尿劑可降低本劑的降血糖活性。

口服降血糖藥物的治療得配合適切的飲食限制，方為正確的治療方式。對食物與劑量不辭辛勞的監督可獲最佳治療結果。在可能的範圍內利用提高飲食的卡路里或減少本劑量而增加身體能量的消耗(生理的發揮)。忽視這些守則易導致急性低血糖症發生，但是利用適當的碳水化合物可將之迅速控制。


貯藏：

室溫(30°C 以下)並遮光貯存。

包裝：

2~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

委託者：

 中化裕民健康事業股份有限公司
Chunghwa Yuming Healthcare Co., Ltd.
台北市中正區襄陽路 23 號 8 樓

製造廠：

 中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號