

鳳梨口味“晟德”舒痰液  
Soltan Liquid  
(Ambroxol HCl)

3毫克/毫升(鹽酸安布索)  
3mg/ml "Center"

GMP  
衛署藥製字第 043160 號  
G-6790

主成份：每毫升(ml)含有  
Ambroxol Hydrochloride.....3.0mg

適應症：祛痰。

用法用量：本藥須由醫師處方使用  
用量：12歲以上：每次10毫升，每日服用3次。  
治療12歲以下兒童，請依照下列劑量：  
6-12歲：每次5毫升，每日3次。  
2-6歲：每次2.5毫升，每日2~3次。  
2歲以下幼兒：每次2.5毫升，每日2次。

藥理作用：  
Ambroxol Hydrochloride可提高肺部界面活性劑的產生及增加纖毛運動，用以改善黏液的流動與排除。Ambroxol Hydrochloride藉由纖毛運動增加，使患者將痰液容易咳出而達祛痰之效果，並可使咳嗽緩解。

注意事項：  
1.對主成分過敏者禁用。  
2.與抗生素併用時，會提高抗生素在肺部組織的濃度。  
3.孕婦服用本品時仍須注意慣例應注意事項，懷孕前期(3個月)用藥，更應謹慎觀察。

警語：  
本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

副作用：輕微的上消化道副作用，(胃灼熱、消化不良、偶爾噁心、嘔吐)。

包裝：15~4000毫升塑膠瓶裝

儲存：  
(1)本品應置於兒童不及之處。  
(2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

舒康液 "舒康" 舒康液  
Soltan Liquid  
(Amoxicillin HCl)

GMP  
中華民國 94 年 10 月 10 日  
G-4780

主成分：舒康液 (m) 舒康液  
Amoxicillin Hydrochloride 1.0g

規格：每瓶 10 瓶

用法與用量：舒康液  
1. 成人：每日服 3 次，每次 1 公升，以上為 1 公升。  
2. 兒童：每日服 3 次，每次 0.5 公升，以上為 0.5 公升。  
3. 6 歲以下兒童：每日服 3 次，每次 0.25 公升，以上為 0.25 公升。  
4. 6 歲以下兒童：每日服 3 次，每次 0.125 公升，以上為 0.125 公升。

舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 係由舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 及舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 所組成。舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 係由舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 及舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 所組成。舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 係由舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 及舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 所組成。

：舒康液

。舒康液係由舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 及舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 所組成。

。舒康液係由舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 及舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 所組成。

。舒康液係由舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 及舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 所組成。

：舒康液

。舒康液係由舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 及舒康液 (Amoxicillin Hydrochloride) 所組成。

晟德大藥廠股份有限公司 (公司)  
CENTER LABORATORIES INC.  
地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓  
晟德大藥廠股份有限公司新竹廠 (製造廠)  
廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號  
公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380  
工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820  
CTRA-027 20130107

14S17-C01