

# 維六素錠 50毫克

## Beesix Tablets 50mg

B群維生素是屬水溶性維生素，用於預防及治療維生素B之缺乏。此種缺乏會由於不適當的營養或胃腸道吸收不良所引起，個別B群維生素的單純性營養不足是少見的，因為膳食之不適當通常是造成多種維生素之不足。維生素B<sub>6</sub>已被用於某些Sideroblastic anemias的治療上。


下列情況下Pyridoxine的需要量可能增加（雖然缺乏一般是少見的）：酒精中毒（肝硬化）。甲狀腺機能亢進、泌乳、吸收不良症、先天性代謝機能障礙（半胱胺甲硫胺酸尿症、高草酸鹽尿症、類胱胺酸尿症、黃嘌呤酸尿）及充血性心臟衰竭和嬰兒（特別是接受人工配方食物）以及年老的病人。

Pyridoxine的膳食需要量與蛋白質的攝取有關。於緊張壓抑（懷孕、泌乳、長期感染、甲狀腺機能亢進、灼傷）時需要量會增加。

某些新生兒患有遺傳性Pyridoxine依賴症，出生後的第一個星期需要Pyridoxine用以防止貧血及智力遲鈍；其原因不明但症狀則為過度興奮及癲癇狀的全身痙攣。

Pyridoxine對於粉刺與其他皮膚病、酒精中毒、氣喘、痔、腎結石、心智混亂、偏頭痛、孕婦晨吐、射線病或行經前的緊張的治療或泌乳或食慾的刺激作用尚未證明有效。

本品主成分Pyridoxine HCl之化學結構式為：



### 主成分：維六素錠

每錠含：Pyridoxine HCl.....50mg

適應症：妊娠引起之噁心、嘔吐、皮膚炎、維生素B<sub>6</sub>缺乏症。

藥理作用：1.吡多辛（Pyridoxine）在體內被轉變成Pyridoxal phosphate及Pyridoxamine phosphate。它們是各種代謝功能的輔酶會影響蛋白質、碳水化合物及脂質的代謝。在色胺酸變成菸草酸的轉換上，Pyridoxine也參與其中。

2.除了諸如熱帶口瘡、腹部疾病或局部性腸炎或施予胃切除之後等因素會導致吸收不良症之外，B族維生素通常易自胃腸道吸收並由肝臟代謝，腎臟排泄（幾乎全為代謝物）。超過每日需要量多半為未變化原型排泄於尿中。

3.本藥可為血液透析所移除。透析病人其Pyridoxine需要量應增加。

注意事項：1.本藥投用於攝取每日正常需要量之孕婦的安全性尚未確立。其使用上的危險與效益應加考慮。胎兒暴露於大量Pyridoxine的子宮內會導致Pyridoxine依賴症。

2.本藥投用於攝取每日正常需要量之Pyridoxine的哺乳婦之安全性未確立。其使用上之危險與效益應加考慮。

3.Chloramphenicol、Cycloserine、Ethionamide、Hydralazine、Immunosuppressants、Isoniazid或Penicillamine，由於其對Pyridoxine的拮抗作用或增加Pyridoxine的排泄而造成貧血或週邊神經炎，因此。使用上述藥物時增加Pyridoxine的劑量是有其必要的。

4. 本藥不宜與Levodopa共用，因為每日口服本藥5mg就會使Levodopa的Antiparkinsonism作用產生逆轉，但如將Carbidopa與Levodopa的併合使用，則不致於發生。
5. 使用口服避孕藥時，本藥的需要量可能增加。
6. 使用Ehrlich's試劑測定尿胆質原時本藥會造成偽陽性反應干擾診斷試驗結果。
7. 本藥如同其他水溶維生素一樣很少對正常腎臟功能的人造成毒性。
8. 忘記服用不必擔心，因本藥之耗竭需時很長，儘量記住遵照指示時間服用。
9. 單一維生素B缺乏是罕見的，故常與他種維生素合用。
10. 無法口服給藥（如噁心、嘔吐、手術前後）或有吸收不良症或施予胃切除手術之後的病人應予注射途徑給藥。

用法·用量：

一般成人劑量：

Pyridoxine依賴症：初劑量—口服，每日30至600mg。

維持劑量—口服，每日50mg，終身服用。

膳食補充：口服，每日10至20mg，為時3週，繼之每日2~5mg（於多種維他命製劑）為時數週。

【注意】因服用避孕藥導致不良影響之婦女，建議每日補充劑量為10~25mg。

先天性代謝機能障礙（半胱胺甲硫胺酸尿症、高草酸鹽尿症、類胱胺酸尿症、黃嘌呤酸性尿）每日100至500mg曾被使用過。

藥物誘生性Pyridoxine缺乏症：

預防：口服，每日10~50mg（對Penicillamine）或每日100~300mg（對Cycloserine、Hydralazine或Isoniazide）。

治療：口服，每日50~200mg，為時3星期，隨後視需要每日25~100mg。

酒精中毒：口服，每日50mg，為時2~4星期，視需要予無限期的延續。

遺傳性鐵質過多貧血(Hereditary sideroblastic anemia)：口服，每日200~600mg。為時1~2個月。若有效繼之以每日30~50mg。終身服用。

一般兒童劑量：

Pyridoxine依賴症：

嬰兒：維持劑量—口服，每日2~10mg，終身服用。

孩童：見一般成人劑量。

膳食補充：口服，每日2.5~10mg，為時3星期，繼之以每日2~5mg（於多種維他命製劑）為時數週。

本藥須由醫師處方使用。

包裝·貯藏：1. 本品應包裝於緊密容器，貯於陰涼（15~30°C）乾燥處所。

2. 2~1000錠茶色玻璃瓶裝、塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第027940號



榮民製藥股份有限公司

Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.

中壢市中山東路三段447號

40410322②