



衛署藥製字第23534號

**Ropal Ropal Ropal Ropal**

“皇佳” **熱痛寧** 錠 (阿斯匹林)  
“Royal” **Ropal** Tablets (Aspirin)

主成份：每錠含有  
Aspirin ..... 100mg

賦形劑：Mannitol、Milled Soda-Saccharin、Yellow starch、Orange oil flavour、Colloidal silicon dioxide、Sodium starch glycolate。

適應症：退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)

用法用量：發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，每24小時內不可超過3次。飯後半小時內服用為宜。成人每次5錠，12歲以上適用成人劑量。  
醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 五、不得併服含酒精飲料。
- 警語：  
 一、服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時應停藥並就醫。  
 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。  
 三、服用本類製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。  
 四、成人不得連續服用本類製劑超過7天，小孩不得超過3天，視情形需要，繼續服用本類製劑前，請洽醫師。  
 五、懷孕第1~2期婦女：除非醫師藥師藥劑生指示，不得自行使用。  
 懷孕第3期婦女：不得使用。  
 六、不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。  
 七、本藥不得使用於12歲以下兒童，亦不得使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病—雷氏症候群(Reye's Syndrome)有相關性。  
 八、蠶豆症(6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不得服用本藥。  
 九、本藥含Aspirin 應注意下列事項：  
 (一) 酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為Aspirin可能造成胃出血。  
 (二) 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。  
 (三) 可能引起胃腸不適、胃腸出血、皮膚出疹、出血傾向、氣喘、耳鳴等不適症狀。

包裝：10~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

儲存：於25°C以下避光乾燥處貯存。



**皇佳化學製藥股份有限公司**

ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.

高雄市鳥松區松浦路1巷1號 電話:(07)7310537  
傳真:(07)7310538