

洛黴欣 乳膏 2% 衛署藥輸字第020022號

(Lomexin Cream 2%)

洛黴欣 外用噴霧劑 2% 衛署藥輸字第020042號

(Lomexin)

洛黴欣 陰道軟膠囊 衛署藥輸字第020053號

(Lomexin)

成分：

乳膏：每gm含Fenticonazole Nitrate.....20 mg

外用噴霧劑：每ml含Fenticonazole Nitrate.....20 mg

陰道軟膠囊：每粒含Fenticonazole Nitrate.....200 mg

特性：

Lomexin為廣效的抗黴菌藥物，用於皮膚科及婦科，主要分為fenticonazole, [1(2,4-dichlorophenyl)-2-(N-imidazolyl)ethyl-4-phenylthiohenzyl ether nitrate]，本品為imidazole衍生物，由Recordati所合成。

Lomexin具有殺菌及抑制黴菌之效用，作用於表皮黴菌屬、致病酵母菌、dimorphous fungi及絲菌上。

Lomexin對於下列菌種有效：Tricophyton mentagrophytes, T. verrucosum, T. rubrum, T. tonsurans, T. terrestre, Microsporium canis, M. gypseum, M. audouinii, M. fulvum, M. cookie, Epidermophyton floccosum; candida albicans; Criptococcus neoformans; Geotrichum candidum; Torulopsis glabrata; Sporotricum schenckii; Aspergillus niger, A. fumigatus, A. flavus; Penicillium crysogenum。

適應症：

皮膚菌病(Dermatomycosis)：導因於皮膚菌感染；包括髮黴菌屬(Trichophyton)，小芽胞黴菌屬(Microsporium)，以及表皮黴菌屬(Epidermophyton)因感染部位不同可分為：禿髮癬、錢癬、股癬、足癬、tinea manuum、tinea faciei、髮癬、甲癬等。

皮膚念珠菌病：常見的有肛擦爛、念珠性口角瘡、臉部念珠菌病、“napkin”、會陰及陰囊念珠菌病、生殖器念珠菌病：(女陰與陰道炎、月經感染、陰莖頭炎、陰莖頭包皮皮炎)、甲床炎及甲溝炎。

用法用量：

每日一至二次，在清洗擦乾後，將Lomexin塗抹在患部。

- 乳膏最好在乾燥的黴菌病上：如花斑癬、紅癬、甲黴菌病(用在甲黴菌病上，乳膏需以閉合方式塗抹)，乳膏亦適合用在男性生殖器的黴菌病。
- 噴霧劑適用於大面積及長有體毛的皮膚，且對於不易塗抹的蔓延菌病區域使用方便。
- 陰道軟膠囊：每日一次睡前使用200毫克陰道軟膠囊一粒。

在皮膚黴菌感染上使用Lomexin，應規律使用，直到疾病痊癒(平均2~3星期)在陰道感染方面，臨床上顯示3~6天即可治療痊癒，然而，適當的延長治療，可避免再度感染。

Lomexin不油、不髒，且易用水洗淨。

副作用：

Lomexin在皮膚及黏膜上有很好的耐受力，僅有輕微瞬間紅斑性反應，局部使用於傷口或陰道給藥有輕微的灼熱感，然很快會消失，如有持續性刺激反應，並擴散到其他器官，應立刻停藥，並向醫師求診。

0678 G

IL11146/F

禁忌：
已知對本品有過敏者不可使用。

警語：
局部使用於開放性傷口，或在陰道內用藥後，會產生輕微短暫的灼熱感，但若長期局部使用會有過敏現象，懷孕期間請勿使用本藥。

包裝：
乳膏劑：100公克以下軟管裝。
噴霧劑：100公撮以下瓶裝。
陰道軟膠囊：2-1000粒盒裝。

有效期限：3年
本品應置於孩童伸手不及處，且不可使用於眼睛。
本藥須由醫師處方使用

賦形劑：
洛微欣乳膏 2%
Propylene Glycol, Hydrogenated Lanolin, Almond Oil, Polyglycolic Ester of Fatty Acids, Cetyl Alcohol, Glyceryl Monostearate, Sodium Edetate, Purified Water
洛微欣外用噴霧劑 2%
Alcohol, Propylene Glycol, Purified Water
洛微欣陰道軟膠囊
Sodium Ethyl Hydroxybenzoate, Sodium Propyl Hydroxybenzoate, Triglycerides of Saturated Fatty Acids, Colloidal Silicon Dioxide, Gelatin, Glycerin, Titanium Dioxide

洛微欣乳膏 2%
洛微欣外用噴霧劑 2%
製造廠：Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.P.A.
地址：Via Civitali, 1-20148 Milano Italy

洛微欣陰道軟膠囊
製造廠：Catalent Italy S.p.A.
地址：Via Nettunense Km 20, 100-04011 Aprilia (LT), Italy

藥商：健喬信元醫藥生技股份有限公司
地址：新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號



0678 G

IL11146/F