

持續性黃體荷爾蒙製劑


# 普寶胎注射液 125 毫克/毫升

## Progesteron Depot Intramuscular 125mg

**【組成】**

每安瓿 (1ml) 含有 Hydroxyprogesterone Caproate 125mg

化學式：17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione hexanoate



為淡黃色油性澄明注射液。

**【賦形劑】**

Benzyl Alcohol、Benzyl Benzoate、Sesame Oil

**【作用】**

一般 Progesterone 油性劑，一次大量投予在體內也很快被排泄失去其作用，故要維持長時間的有效血中濃度很困難，而黃體荷爾蒙劑適應症，常都須長期治療。為達此目的而發展出本劑—強力之持續性黃體荷爾蒙製劑，一次注射即可呈藥效，其藥效持續 7-14 日，此種持續性藥效與高濃度的製劑，對於女性因黃體荷爾蒙不足所引起之症狀，具有優越的治療效果。

本劑無不良副作用，它可用於孕婦，而對子宮內之胎兒無不良影響。

**【適應症】**

月經困難、子宮出血、習慣性流產、迫切性流產。

**【用法用量】**

肌肉注射每次使用量 250mg，藥效維持 7-14 天；習慣性流產及迫切性流產，每次 250-500mg。

**【類別】**

本藥限由醫生使用。

**【注意事項】**

1. 本劑禁忌使用者：
  - (1) 重症肝障害、肝病者。
  - (2) 妊娠期濕疹既往病例者。
2. 本劑使用時要慎重注意投予者：患有心脏疾患、腎疾患或有此等症狀之既往歷之患者（或有鈉或體液貯留之現象）請慎重使用。
3. 本劑使用上如遇有發疹、過敏時，請停止使用。
4. 本劑使用上如有肝機能異常症出現，使用時要十分小心觀察使用，必要時減量或停藥，做適切處置。
5. 本劑使用上如有電解質代謝上症狀（例如浮腫或體重增加等）出現，使用時要十分小心觀察使用，必要時減量或停藥，做適切處置。
6. 其他：黃體荷爾蒙劑之使用與先天異常之生產，雖未確定其因果關係，但發生生產心臟、四肢等之先天異常兒之母親與對照群比較，其於妊娠初期使用黃體卵泡荷爾蒙劑者其比率略有差別，故孕婦或可能懷孕之婦女禁用，此乃免疫學調查之報告。
7. 使用上之注意：
  - (1) 有產生局部硬結的可能。
  - (2) 肌注時請注意下列事項：
    - 避開神經走行部位
    - 如需連續使用請左右邊交互注射。
    - 請確實觀察注射器反吸時無血液逆流現象。

**【副作用】**

- (1) 過敏症：如有發疹等過敏症
- (2) 肝臟：偶有肝機能異常之現象發生，請注意觀察，如有此現象請減量使用或暫時停藥。
- (3) 電解質代謝：偶有浮腫、體重增加等症狀之發現，請注意觀察，如有此現象，須減量使用或暫時停藥。
- (4) 精神神經系：偶有頭痛、嗜睡等症狀之發生。
- (5) 其他：偶有倦怠感發生。

**【包裝】**

1 毫升玻璃安瓿裝，100 支以下盒裝。

**【儲存條件】**

遮光、25°C 保存

藥商：一成藥品股份有限公司  
 地址：新北市汐止區新台五路一段 77 號 20 樓  
 製造廠：大豐製藥股份有限公司  
 製造廠廠址：彰化縣彰化市延平里岸頭巷 11 號