

【成分】 Each tablet contains:

Butinolin phosphate..... 2 mg  
Calcium carbonate..... 300 mg  
Dried aluminum hydroxide gel..... 200 mg

【適應症】胃酸過多、胃炎、十二指腸炎、胃及十二指腸潰瘍所引起之痙攣及疼痛。

【用法用量】通常成人一日三次，每次1錠，請依年齡、症狀增減使用。

【類別】本藥須由醫師處方使用。

【藥理】(1)1-pyrrolidino-4,4-diphenyl-butin-(2)-ol-(4)-H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> :

本成分是一種 anticholinergic 及 myotropic spasmolytic 作用劑。作用因此比 atropine 強，但散瞳之副作用只有 atropine 之 7/100 而已。不影響心臟循環，對胃腸道、膽囊、膽管以下泌尿管等之痙攣疼痛有效。

(2)Calcium carbonate :

能與過量之胃酸中和，形成 calcium chloride，為制酸劑，又本品只與過量之胃酸作用，而未結合作用之部份能排出體外，因而不致刺激胃酸之再分泌，為一安全之制酸劑。

(3)Dried aluminum hydroxide gel :

亦有中和胃酸作用。可形成薄膜被覆潰瘍表面而保護消化器官。

【注意事項】腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症 (Dialysis osteomalacia)、透析性腦病變 (Dialysis encephalopathy) 及低磷血症，應謹慎小心使用。

【賦形劑】 Starch pregelatinized、Sodium starch glycolate、Sodium Saccharin、Magnesium stearate、Peppermint oil、Silicon dioxide hydrated、Microcrystalline cellulose、Tartrazine aluminum lake。

【儲存】於 25°C 下儲存，避免陽光直射，應置於孩童無法取得之處。

【包裝】6~1000錠 PTP 鋁箔盒裝，塑膠瓶裝。