

“景德”舒體錠 2公絲

STIDINE Tablets 2 mg (Tizanidine) “Kingdom”

【成分名】

Tizanidine hydrochloride

【劑型、含量】

錠劑：每錠含 Tizanidine hydrochloride
(eq. to Tizanidine …… 2 mg)

【特性】

Tizanidine 是一種中樞作用性骨骼肌鬆弛劑，主要作用位置在脊髓，能選擇性抑制負責肌肉過度張力的多突觸機轉，主要在於減少中間神經單位興奮性胺基酸的釋出。本品不影響神經肌肉的傳導。Tizanidine 耐受性良好，能有效對抗急性疼痛性肌肉痙攣及慢性脊髓及大腦源起的痙攣狀態，減少被動運動時的抵抗力，緩解痙攣及陣攣並增強隨意肌的力量。

【藥物動力學】

Tizanidine 能迅速而且幾乎完全被吸收，在 1 ~ 2 小時內達到顛峰血清濃度。大部分在肝臟代謝，代謝物相當不具活性。原型藥與其代謝物主要由腎臟排出 (近 70%)，以 3 ~ 5 小時之半衰期排出體外。血漿蛋白結合力低 (30%)。

【適應症】

神經疾患所引起之痙攣症狀、疼痛性肌肉痙攣。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

神經疾患所引起之痙攣症狀：劑量依病人個別的需求調整，開始時每日劑量不可超過 6 mg，分三次投予，每半週或一週漸次增加 2 ~ 4 mg，通常在每日劑量 12 ~ 24 mg，投予 3 或 4 次同樣的間隔劑量時發生最理想的治療反應。每日最大建議劑量為 36 mg。

【禁忌】

仍未有已知的禁忌。

【注意事項】

腎臟或肝臟功能受損的病人必需調整其劑量。開始治療時，病人會有思睡的現象，應告知不要進行需高度警覺性的活動，比如開車或操作機械。

Tizanidine 對動物沒有致畸胎作用，但是懷孕期的安全性仍未確立。兒童使用本品的經驗仍有限，對吃母乳的嬰兒，其安全性仍未知，與所有的藥物一樣，Tizanidine 應置於孩童無法拿到的地方。

【交互作用】

Tizanidine 與抗高血壓劑包括利尿劑併用，有時會引起低血壓及心搏徐緩。鎮靜劑包括酒精，可能會增強 Tizanidine 的鎮靜作用。

【副作用】

依緩解疼痛性肌肉痙攣建議的低劑量，罕有副作用而且通常輕微而且是暫時性的。副作用包括思睡、疲勞、頭暈、口乾、噁心及輕微的血壓下降。

依痙攣狀態建議的較高劑量，上述副作用較常見也較顯著。但是很少嚴重到需要停止治療。除此之外，可能發生肌肉虛弱及失眠。曾觀察到低血壓及心搏徐緩的例子。少數病人曾暫時性升高血清中的 transaminases。

【過量使用】

截至目前為止，只有一個成人病例服用 400 mg Tizanidine，病人康復的情形十分良好。

症狀：
噁心、嘔吐、低血壓、頭暈、瞳孔縮小、呼吸困難、昏迷。

症狀治療：

包括心臟血管及呼吸系統的支持療法，仍未有專一性解毒劑。

【貯存】

應保存於室溫 25°C 以下。
請放置於兒童伸手不及之處。

【包裝】

6 ~ 1000 錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 045541 號
G-7935

景德製藥股份有限公司

廠址：台北縣土城市中央路二段 104 號