

紙張尺寸：10X20公分

“景德”

# 痙得寧 錠 0.125 毫克 NUSPAS Tablets 0.125 mg “Kingdom”

## 【主成分名】

Hyoscyamine Sulfate

## 【劑型、含量】

錠劑：每錠含 Hyoscyamine Sulfate ..... 0.125 mg

## 【適應症】

下列疾患之痙攣及運動機能亢進、胃潰瘍、胃酸分泌過多、內臟痙攣、痙攣性結腸炎、膀胱炎、幽門痙攣、妊娠嘔吐、腎痙攣、膽痙攣、痛經。

## 【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人及12歲以上兒童：一次1-2錠，每4小時或需要時一次，每日不超過12錠。

2-12歲兒童：一次1/2-1錠，每4小時或需要時一次，每日不超過6錠。

視症狀及嚴重度調整劑量。

## 【作用】

- 1.本藥可專一性抑制乙醯膽鹼於神經節後膽素性神經及於平滑肌之作用。而未稍膽素性接受體則廣存於平滑肌、心肌、竇房結、房室竇及外分泌腺，在治療劑量下，本藥並不作用於自主神經之上。
- 2.Hyoscyamine能抑制胃腸道之運動性並降低胃酸之分泌作用。另外，本藥亦能控制咽部、氣管及支氣管之過度分泌作用。
- 3.Hyoscyamine以口服及舌下給藥均能迅速而完全地被吸收，並分佈至全身，半衰期為2 - 3.5小時。
- 4.Hyoscyamine於體內可部份被水解成tropic acid及tropine，而主要藥物於12小時內以原形方式排泄於尿中，僅微量藥物出現於乳汁中。Hyoscyamine能通過血液障壁及胎盤。
- 5.本藥到達最高血中濃度時間約4小時，血漿排泄半衰期約9小時。

## 【禁忌症】

青光眼、阻塞性尿路症狀（如前列腺肥大導致膀胱阻塞）、胃腸道阻塞症狀（如弛緩不能、幽門十二指腸道狹窄）、痙攣性腸阻塞、老年人或衰弱患者之小腸張力缺乏、急性出血之不穩定性心血管狀態、嚴重潰瘍性結腸炎、毒性巨腸症併發之潰瘍性結腸炎及重症肌無力之患者禁用本藥。

## 【警語】

- 1.處於高溫環境下之患者應謹慎給藥(如發熱及熱中風導致排汗降低)。
- 2.不完全腸道阻塞患者可能出現下痢情形，尤其是接受迴腸造口術或結腸造口術之患者。
- 3.與其他抗膽鹼性藥物相似，Hyoscyamine可能導致嗜睡、眩暈或視視等，另外需留心操作機械及開車等危險工作。
- 4.使用本藥時，針對部份敏感患者可能出現精神神經系統方面症狀，如混亂、無方向感、短暫性記憶消失、幻覺、發音困難、運動失調、昏迷、欣快、焦慮感減低、疲勞、失眠、不安及不適當之情緒反應，症狀通常於停藥後12 - 48小時內即可消失。

## 【注意事項】

- 1.下列患者應謹慎用藥：自主神經疾患患者，甲狀腺機能亢進、冠心病、鬱血性心臟病、心律不整、高血壓及腎臟疾病患者。
- 2.使用抗膽鹼性藥物前應檢查患者有否心跳過速現象以避免藥物可能造成心跳加速之現象。
- 3.本藥於罹患裂孔性疝氣併逆流性食道炎患者應小心用藥。
- 4.交互作用：  
與下述藥物併用時可能加重下列藥物副作用之發生，如抗革素性藥物、amantadine, haloperidol, phenothiazines, MAOI, tricyclic antidepressants或某些抗組織胺劑。  
因製劑劑可能干擾本藥之吸收，故本藥應於餐前服用，而制酸劑則於飯後服用。
- 5.尚無長期研究動物使用Hyoscyamine之致癌、致突變及生育缺陷之報告，另外，Hyoscyamine 40年以上之臨床經驗亦無此方面之報導。

## 【孕婦、授乳婦之投與】依文獻記載

動物生殖試驗並無不良影響。本藥使用於孕婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕之婦女，宜先權衡治療之必要性方始投與。  
Hyoscyamine會分泌於乳汁中，因此，授乳婦應謹慎使用。

## 【副作用】

與其他抗膽鹼/抗痙攣劑相似，下述症狀可能出現於少數患者，包括口乾、尿液滯留、複視、心跳過速、心悸、瞳孔放大、睫狀肌麻痺、視覺張力增加、味覺喪失、頭痛、神經質、嗜睡、虛弱、眩暈、失眠、噁心、嘔吐、陽萎、乳汁減少、便秘、脹氣、特異體質之過敏反應、蕁麻疹、運動失調、睡眠困難、混亂或興奮及減少排汗等。

## 【過量與治療】

過量時症狀如，頭痛、噁心、嘔吐、複視、眩暈、皮膚燥乾、眩暈、口乾、吞嚥困難及中樞神經症狀等。  
治療：立即洗胃並靜脈注射0.5 - 2 mg physostigmine，必要時，可重覆給藥至5 mg。發熱時施以症狀治療（溫水浴等）。

## 【賦形劑】

Lactose monohydrate、Microcrystalline Cellulose 101、Sodium Starch Glycolate、Povidone K-30、Magnesium Stearate

## 【貯存】

室溫（25℃以下）儲存。  
本藥應置於小兒伸手不及處，以免誤食，造成危險。

## 【包裝】

12 - 1000粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

衛署藥製字第048150號

委託者：景德製藥股份有限公司  
台北市中山北路二段113號8樓  
製造廠：榮民製藥股份有限公司  
桃園市中壢區中山東路三段447號

40417014 ©

 PANTONE BlackC

 PANTONE Red 032C