

"柏理"

**乙酸可體松錠 25毫克**

Cortisone Acetate Tablets 25mg "Pine Lawer"

**【成分】**每錠含

Cortisone Acetate.....25mg

**賦形劑：**

Starch, Lactose, Pregelatinized Starch, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Purified Water。

**【適應症】**

風濕性關節炎、急性風濕熱、過敏性病、炎症性眼病、皮膚病、贅生性疾病及阿迪生氏病。

**【用法/用量】**

服用本品應在醫師指導下使用，患者應逐日仔細視察，當其對可體松能完全發揮療效時，應即調整維持劑量，治療期間應經常測量血壓與體重，小便檢驗，心動電流圖與血球計算，有時視需要而應作血糖，二氧化碳結合能力及血內電解質之測定。

1. 類風濕性關節炎之劑量：每24小時內給100mg（即四片分成二至四次服用），連用二星期或至療效出現為止，然後逐漸減低劑量，每次減5mg或更多些，一直調節至最小合適之維持劑量，（最理想者為每日使用50~75mg.或少於此量）。
2. 急性風濕熱之劑量：第一天給400mg.分成數次服用，以後每天200mg.也分成數次服用，直至療效出現，即改用每天50mg.或少於此量的維持劑量續服6~8星期。
3. 阿迪生氏病之劑量：每日10~25mg.，佐以4~9克之氯化鈉，或1~3mg.之Desoxycorticosterone Acetate，以維持血內電解質之量而使病況進步。
4. 治療其他各病之劑量與類風濕性關節炎之用量相似，不過對於腎上腺性徵異常症之用量應視個別之需要不同而定，而喉頭水腫及嚴重哮喘須用大劑量（第一二天為300至500mg.），以後即用維持劑量或停藥，慢性哮喘患者須長期使用，療效顯著。

本藥須由醫師處方使用。

**【注意事項】**

1. 心臟儲存血量減少，充血性心臟衰竭，高血壓，精神病傾向，糖尿病，腎機能不足，久病健康不良，胃潰瘍，衰老，最近手術以後如腸吻合術。有活動性或可疑性癒合之結核病灶時，暫時不要應用本劑，於其他急性或慢性細菌炎症時，本品可以使用，但須併用抗生素及化學療法。
2. 限制鈉鹽之攝取、矯正低鉀血症。
3. 結核病、活動性或消化性潰瘍患者應禁用。
4. 需控制血糖過高。故高血壓、糖尿病患者服用應多加注意。
5. 避免身心過度疲勞。如發現有副作用（如失眠、多毛、粉刺等）產生時需暫時停藥。
6. 除去阿迪生氏症及其他必要條件，本劑不能與其他荷爾蒙劑併用。
7. 急性及慢性傳染炎症服用本劑時，應同時治療傳染病灶。

**【包裝】**

2-1000錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。

**【儲存條件】**

保存於30℃以下為佳，避光儲存之。



委託者：柏理貿易股份有限公司  
 地址：台北市104松江路65號4樓  
 訂貨專線：02-2500-6378 / 傳真：02-2503-7755  
 製造廠：政德製藥股份有限公司  
 地址：雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號 電話：05-5911-101