

貝隆芬 錠 10毫克

BACLON Tablets 10mg

衛署藥製字第 049335 號

組成：

Each tablet contains Baclofen 10mg

賦形劑包括：Lactose, Maize Starch, Povidone, Magnesium Stearate

適應症

限用於脊髓和大腦之疾病或損傷所引起之肌肉痙攣。

用法、用量

本藥須由醫師處方使用

初劑量 5mg，一天三次。依照治療的反應，在第 3-7 天可逐漸增加至 15mg。維持劑量通常是 30-60mg，但視情形而定，有時甚至初劑量的 15mg 就足夠了，只有住院病人才可給一天 100mg 以上的劑量。

對於腎臟機能不足的患者，則應當減低劑量。此錠劑應在進餐時間服用。

副作用

當劑量的多寡依個別的需要而加以調整時，發現 baclofen 有很好的忍受力而且沒有嚴重的副作用。

常見的副作用有鎮靜、暈眩、嘔吐、下痢和肌無力。另外，像抑鬱、神志混亂，有欣快感，及皮膚發疹等副作用亦有發現，頻尿是很少見的副作用，可以使用膽素阻斷劑來治療。突然終止給藥可能會導致幻覺。

相互作用

血壓下降的現象可能發生，尤其當 baclofen 和降血壓劑合併使用時，更應注意其發生的可能性。

注意事項

使用 baclofen 治療期間，癲癇患者病情會加重。對於呼吸器官麻痺的病人，要特別小心使用 baclofen，它會使開車、操作機械及設計創作能力降低。懷孕期間的婦女禁止服用此藥。此外必須以逐漸減少劑量的方式來停止 baclofen 的治療。

包裝：12 - 1000 錠 / 塑膠瓶裝

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 6

電話：(02) 2655-7568

製造廠：科進製藥科技股份有限公司新竹廠

廠址：新竹縣竹北市生醫路 2 段 22、26 號 4 樓

340002-1