

"政德" **樂華淨** 注射劑 0.5gm/1gm/2gm  
Lofatin Injection 0.5gm/1gm/2gm "Gentle"

本品係一種新型Cephalosporin(頭孢子菌素)系抗生素，其特徵在構造式7位上有Methoxy group，具有對B-lactamase，penicillinase，Cephalosporinase高的安定性不易產生抗藥性構造式3位不含MTT(1-Methyl-1H Tetrazole-5-Thiol)側鏈故無延遲凝血時間等之副作用。本品具有對抗嗜氧及厭氧之G(+)及G(-)細菌之廣效抗菌作用。對混合感染中最常見的Bacteroides fragilis(此種混合感染對Penicillins，Aminoglycosides，cephalosporins均有抗藥性)本品具有良好之效果。對能產生Penicillinase及對Spectinomycin具有抗藥性之淋球菌亦相當有效。

【成份】每Vial含 主成分：  
Cefoxitin(as sodium).....500mg/1000mg/2000mg (potency)  
賦形劑：無

【適應症】葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染性。

【用法用量】通常成人一日2~4g分2~4次，加蒸餾水、生理食鹽水行靜脈或點滴注射，或加0.5%Lidocaine稀釋後行深部肌肉注射。  
本藥限由醫師使用。

- 【注意事項】
- 1.一般注意事項：須先做休克之過敏試驗。
  - 2.禁忌：對本藥曾發生休克之患者。
  - 3.慎重投與：
    - (1)曾對Penicillin系或Cepha系藥物過敏者。
    - (2)本人或雙親及兄弟中有人具有支氣管痙攣、發疹、蕁麻疹等過敏性體質者。
    - (3)嚴重腎障害之患者。
    - (4)經口攝取不良或非經口營養之患者，高齡者、全身狀況不良之患者。
  - 4.副作用：
    - (1)休克，須小心觀察若有不快感、口內異常感、耳鳴、眩暈、便意、噁鳴、發汗等現象應停止用藥。
    - (2)過敏症，發疹、蕁麻疹、紅斑、搔癢、發熱、淋巴節腫脹、關節痛等症狀應停用並適當處理。
    - (3)血液：顆粒球減少，好酸球增多，血小板減少，溶血性貧血。
    - (4)肝臟：出現黃疸、SGOT、SGPT、alkaline phosphatase上昇。  
腎臟：間有BUN creatinine上昇，乏尿、蛋白尿等腎障礙之現象出現，須詳細觀察若有異常現象出現須適當處置。
    - (5)胃腸：發熱腹痛，白血球增多、伴有粘液及血液便等急性下痢症狀的嚴重大腸炎、內視鏡檢查可看見偽膜斑形成，出現偽膜性大腸炎。腹痛及頻回的下痢應即停藥並做適當處置，此外有噁心、嘔吐、下痢、軟便、腹痛、食慾不振、胃部不快感。
    - (6)菌交代症：口內炎、念珠菌症。
    - (7)維他命缺乏症：維他命K缺乏症(低Prothrombin血症，出血傾向)維他命B群缺乏症(舌炎、口內炎、食慾不振、神經炎)。
    - (8)其他：頭痛、目眩、全身倦怠。
  - 5.對孕婦之安全性尚未確立，須基於有益性之判斷再使用。
  - 6.臨床檢查值之影響。
    - (1)除了Test Tape外Benedict氏、Fehling氏液及clinitest的尿糖檢查值呈偽陽性。
    - (2)Creatinine的測定，使用Picric acid反應的測定值會上升。
    - (3)BCG法測定Albumin會與Albumin及BCG結合發生競合阻害測定值減低。
    - (4)直接coombs試驗呈陽性。
  - 7.使用上注意：
    - (1)靜脈內大量投與會引起血管痛、血栓靜脈炎，預防方法須注意注射液之調製，注射部位及注射方法，減慢注射速度。
    - (2)溶解後須儘速使用，若須保存時儲存於25°C以下可保存24小時，在2-8°C可保存5天以內使用。
  - 8.儲存於25°C以下，遮光保存有效期間三年。

【包裝】100支以下小瓶盒裝。(每瓶0.5公克/1公克/2公克裝)



政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號