

「晟德」

# 舒得康 懸液劑


## Simethicone Oral Suspension 「CENTER」

GMP  
衛部藥製字第 059038 號  
G-12707

主 成 分：每毫升(ml)含有

Simethicone Emulsion 30%.....66.67mg (eq. to Simethicone.....20mg)

Dimethylpolysiloxane 具有下列化學構造式，所謂重合體而硅素，氧而直列，是為側鎖的 Methyl 基所加付之半有機化合物。其結構式如下：



適 應 症：

解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

用法用量：醫師藥師藥劑生指示藥。

一天3~4次。或需要時服用

成人劑量，每次2ml。

3歲以上(含)，適用成人劑量。

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

藥理作用：(依文獻記載)

界面活性消泡作用：本劑具有界面活性作用，能使表面張力低下，並發揮消泡效果，對於腹部膨滿感鼓腸時應用本劑有緩解效果。又使胃腸內無數小氣體氣泡之表面張力降低破裂而合為一個大游離氣體，而被排出體外。

藥效學特性

獨特的消泡作用，能使消化器內氣體之吸收排泄良好。

**副作用：**

1. 消化器：軟便，胃部不快感，下痢，腹痛，嘔吐，胃部重壓感，食慾不振。
2. 其他：間有頭痛。

**注意事項：**

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 液劑使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

賦形劑：Hypromellose、Polyethylene Glycol 4000、Citric acid anhydrous、Sodium Citrate、Methylparaben、Propylparaben、Sucralose、Yoghurt Flavor、Water Purified

包 裝：12-4000 毫升塑膠瓶裝

儲 存：

(1)本品應置於兒童不及之處。

(2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地 址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠 址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680

圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829

圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-098 20160426

14S020