

“台裕”甲硫酸新斯狄格明 注射液

Neostigmine Methylsulfate Injection “Tai Yu”

【成分】

Each ml contains:

Neostigmine Methylsulfate 0.5mg

【適應症】

消化液分泌機能減退、排尿困難、腸管麻痺、因肌無力、肌肉麻痺、神經痛、肌肉萎縮等所引起之各種運動障礙、綠內障、眼部肌無力及瞳孔反應檢查。

【用法用量】

1. 皮下及肌肉注射之，每日 1~3 次，每次 0.25~0.5mg。
2. 必要時(Antidote to curare Principle)以 0.5mg 之本劑與 0.6mg 之 Atropine Sulfate 合併而靜脈注射之。
3. 本藥限由醫師使用。

【賦形劑】

Citric Acid、Sodium Bisulfite、Sodium Chloride、Sodium Citrate Hydrous、Benzyl Alcohol、Water for Injection。

【貯存方法】 室溫避光貯存。

【包裝】 1 毫升安瓿裝，100 支以下盒裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL : (03)5826655 FAX : (03)5822389