衛署藥製字第 036151 號

"中國化學"／安布索

平痰息錠 30 公絲

Mubroxol Tablets 30mg

"CCPC"／Ambroxol

綱號：C40

本品主成分 Ambroxol HCl 具有黏液排除促進作用與溶解分泌物的特性，可以促進呼吸道內黏稠分泌物排除及減少黏液的滯留，故能有效地幫助黏液的排除與呼吸之舒暢。由於本品的耐受性良好，故可以放心長期使用。

成分：

每錠含有：Ambroxol HCl……30mg

適應症：

祛痰。

用法．用量：本藥須由醫師處方使用。

1.成人及 10 歲以上的小孩：每日三次，每次一錠。

2. 5 至 10 歲小孩：每日三次，每次 1/2 錠。

3.長期治療時：可減低為每日兩次。

4.妊娠期用法：據動物實驗研究，本品主成分已證明即使用高劑量對胎兒也沒有任何影響，但如同任何製劑一樣並不建議在妊娠之前三個月內使用。

5.錠劑應於飯後拌液體吞服。

副作用：

本品一般的耐受性良好，輕微的胃腸副作用，及過敏反應很少發生。

藥物交互作用：

本品可與其他藥物，尤其是類固醇藥物，支氣管擴張劑及抗生素等合用。

禁忌症：

沒有已知的禁忌症。

警語及注意事項：

有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑(erythema multiforme)史帝文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(Stevens-Johnson syndrome<SJS> / toxic epidermal necrolysis <TEN>)急性廣泛性發疹性膿皰症(acute generalised exanthematous pustulosis <AGEP>)嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含 ambroxol 或 bromhexine 成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀（如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛）。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

不良反應：

免疫系統疾患：

罕見：過敏反應（hypersensitivity reactions）

頻率未知：過敏性反應（anaphylactic reactions）（包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症）

皮膚及皮下組織疾患：

罕見：皮疹、蕁麻疹

頻率未知：嚴重皮膚不良反應（包括：多形性紅斑、史帝文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿皰症）

過量：

目前尚無過量的症狀指導，如果它們發生時應該對症治療。

貯存：遮光密封室溫貯存。

包裝：6~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

賦形劑：Microcrystalline cellulose(Avicel 101、Avicel 102)，Lactose，starch corn，Hydroxypropyl cellulose，Primojel，Magnesium stearate

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 Ⓓ