

## 喜達鎮錠 (4公絲)

**Cytadine** Tablets (4mg)

本品不只具有強大抗組織胺(Histamine)之作用，而且對血清壓縮質(Serotonin)顯示理想之拮抗作用；因此對於Histamine及Serotonin所引起之各種過敏性疾患及各種搔癢性皮膚炎症均能給予迅速之治療與預防。又本品與一般抗過敏藥劑不同，另具有明顯之食慾增進作用，服用本品後胃口大開，食量大增因而體重迅速增加，此乃本品之一大特色。本品在服用期間鮮少有副作用，(諸如黃疸、粒性白血球缺乏病、震顫麻痺現象、緊張不全症)，故本品可謂副作用極少，安全範圍極大之抗過敏及止癢劑。

成分：每錠含有：

Cyproheptadine Hydrochloride.....4mg

適應症：

- 1.過敏症、搔癢症：皮膚炎症、濕疹、類濕疹性皮炎、枯草熱及季節性鼻炎、終年過敏性血管舒縮異常之鼻炎、蕁麻疹、接觸性皮炎、藥物及血清過敏反應、肛門及外陰搔癢症、昆蟲咬腫。
- 2.氣喘症：通常本品對季節性氣喘之療效較內因性氣喘為佳。
- 3.組織胺性頭痛：約有70~80%之療效。很多用其他藥物無效後改用本品常獲奇效。一般服用本品1~2小時後，頭痛症狀即迅速消失。

用法用量：

- 1.2~6歲小孩-每日3次，每次1/4錠，每日總劑量以2.5錠為限。
- 2.7~14歲小孩-每日3次，每次1/2錠，每日總劑量以4錠為限。
- 3.成人-每日3次，每次1錠，每日總劑量以8錠為限，以上用量，視患者之反應而定，可增減劑量至適宜為止，如每日須服4次，則於睡前增服1次為宜。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

- 1.禁忌症：本品和其他抗膽鹼激性劑(Anticholinergics)一樣，對患有青光眼及小便瀦留患者不宜服用。
- 2.配合禁忌物：忌飲酒精製品或其他中樞神經抑制藥品。
- 3.副作用：較常見之副作用為嗜睡，但此情況往往會因繼續使用三四日後而有所改善；其實對皮膚患者、嗜睡現象反而有所裨益；即降低患者之精神緊張，減少患者皮膚之感受性，從而減輕患者之痛苦。
- 4.服用本品，不宜操縱須精神集中之工作；如駕駛汽車或操作其他精密機器等。

賦形劑：Colloid Silicon Dioxide、Cellulose Microcrystalline、Potato Starch、Sodium Saccharin、Water Purified、Magnesium Stearate

貯存條件：25°C以下儲存。

包裝：50錠，100錠，500錠，1000錠瓶裝。

衛署藥製字第001641號



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台南市新營區土庫里土庫6之20號