

痛 就 擦 凝膠

10毫克/公克(待克菲那)

Tondonac Gel 10mg/gm (Diclofenac Sodium)



【成分】

有效成分及含量：每公克含Diclofenac Sodium10 mg
其他成分(賦形劑)：Coconut oil fractionated、Cetyl alcohol、Stearyl alcohol、Polysorbate 60、Dimethicone 100、Benzyl alcohol、Propylene glycol、Carboxyvinyl polymer、Triethanolamine、L-Menthol、Disodium Edetate、Alcohol、Purified water
本藥成分屬於非類固醇消炎止痛藥成分(NSAIDs)。

【用途(適應症)】

短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 懷孕期的最後三個月，因可能影響胎兒或增加生產過程之風險。
2. 曾因本藥成分引起過敏的人。
3. 曾對其他止痛、發燒或發炎藥品有過敏反應者，例如aspirin (acetylsalicylic acid)、ibuprofen。這些藥品過敏反應的症狀可能包括：氣喘、呼吸出現哮喘聲或呼吸困難、皮膚紅疹或蕁麻疹、臉或舌頭出現腫脹、流鼻涕。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 已連續使用達2個星期。
2. 12歲至18歲未成年患者，且已使用達7天。
3. 12歲以下兒童。
4. 孕婦、計畫懷孕或有可能懷孕的女性。懷孕期的前六個月應儘可能減少使用量與使用次數，以及縮短使用期間。
5. 哺乳婦女，不宜塗抹於乳房部位，亦不宜大面積或長期使用。
6. 已經在使用diclofenac口服藥品或其他非類固醇消炎止痛口服藥品。
7. 疑似皮膚感染症。切勿使用本藥，誤用本藥，可能會使病情惡化，並造成日後診斷及治療的困難。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 患有胃潰瘍或十二指腸潰瘍，或曾有相關病史者。
2. 正在使用任何藥品，包括不是經醫師處方之藥品。

四、其他使用上注意事項：

1. 本藥僅供外用，不可口服，如不慎口服請立即就醫。
2. 請勿超過建議之用法用量。
3. 本藥請勿與眼睛及黏膜接觸。如不慎接觸，請立即用清水沖洗，若仍有不適症狀請立即就醫。
4. 本藥不要塗抹於紅疹或皮疹的皮膚，亦不要塗抹於裂開的皮膚、開放性傷口或任何不正常的皮膚。
5. 如果忘記於預定時間使用本藥，請依原來的使用量塗抹，切勿使用兩倍的使用量。

6. 使用前，如發現本藥有疑似變質或有包裝破損情形，請勿再使用。
7. 使用完畢後，請將瓶蓋鎖緊，保存於陰涼之處，避免陽光直射，並置於小孩接觸不到的地方。

【用法用量】

本藥為醫師藥師藥劑生指示用藥，請依照醫師、藥師或藥劑生指示使用。
每日使用3-4次，24小時內切勿超過4次。
使用時，依據疼痛部位的面積大小來決定使用量，每次使用量約2-4公克，塗抹面積建議在2公分x2公分(約一個五元硬幣之寬度)至5公分x5公分(約兩個十元硬幣之寬度)。
在疼痛部位塗抹本藥品後輕輕揉入皮膚。
使用後，應即洗手，除非手部也是需要治療的部位。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	停止使用後仍有以下症狀： 皮膚紅腫、發癢或刺痛。(每100人，其中1-10人可能發生) 皮膚會對光比較敏感，可能出現曬傷的症狀，包括發癢、紅腫及起水泡。(每1萬人，少於1人可能發生)

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 使用後如症狀未改善或更惡化。
2. 皮膚紅疹且出現水泡、蕁麻疹。(每1萬人，其中1-10人可能發生)
3. 呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、氣喘或呼吸困難。(每1萬人，少於1人可能發生)
4. 臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹。(每1萬人，少於1人可能發生)

【包裝】

1000公克以下鋁管裝

【儲存】

25°C以下避光儲存

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第 032634 號
GMP 優良藥品 G-1819 號



通過 PIC/S GMP 優良藥廠
五洲製藥股份有限公司
桃園市新屋區赤欄里 17-1 號