



永豐藥品

4-125-37-8(14)

“永豐” 葡萄糖注射液 5%

GLUCOSE INJECTION 5%

成分 Each mL contains :
Dextrose 50mg(5%)
本藥含賦形劑 Water for Injection

適應症 因罹急性傳染病等缺乏水份時，因出血過多致營養失調，因有持久的營養障礙。

用法用量 5% GLUCOSE 注射液
通常成人每次注射約500mL ~ 1000mL，行點滴靜脈注射。
依症狀適宜增減之。
本藥限由醫師使用。

注意事項 高張液之靜脈內注射須緩慢，如用大量宜預先以溫水加熱至體溫(攝氏37度或華氏98度)然後注射之。
心臟肥大、心肌衰弱並有血液循環障礙之患者如需用靜脈內注射時，宜先瀉血或抽出與注射量相等之血液，然後注射本液。
重症糖尿病患者須要細心注意。
取用時：
①運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
②若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。
輸液套選用及插入法：
①請依輸液套使用方法正確使用。
②請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
③使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。



永豐藥品

4-125-37-8(14)

【依文獻記載】

「塑膠軟袋(PVC)材質可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP)·男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素」。

儲存條件 本品應儲存於室溫(30°C以下)，並避光存放。

包裝 塑膠安瓿(LDPE) 10mL、20mL
塑膠瓶(LDPE) 50mL、100mL、250mL
塑膠瓶(PP) 250mL、500mL、1000mL
玻璃瓶 250mL、500mL、1000mL
玻璃安瓿 20mL
塑膠軟袋 50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL / 100支以下盒裝。

衛署藥製字第058005號(原內衛藥製字第004463號換發)。



永豐化學工業股份有限公司
製造廠：新莊工廠
新北市新莊區新樹路292號