

# "杏輝" 黴克頓乳膏10毫克/公克 ( 克氯黴唑 )

## MYCOSTEN CREAM 10MG/GM

### "SINPHAR"(CLOTRIMAZOLE)

衛署藥製字 第 025136 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

Clotrimazole 為抗黴菌劑，具有殺死黴菌作用，被用於治療香港腳、表層念珠菌感染。本基劑為乳膏，使用方便。

#### 1 成分

##### 1.1 有效成分及含量

每gm含：

Clotrimazole.....10mg

##### 1.2 其他成分(賦形劑)

Cetyl Stearyl Alcohol、White Petrolatum、Liquid Petrolatum、Span 60、Tween 60、Methylparaben、Propylparaben、Propylene Glycol、Water Purified.

#### 2 用途(適應症)

治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、體癬、股癬、汗斑。

#### 3 使用上注意事項

##### 3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

##### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 有深部皮膚組織感染。

##### 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在接受醫師治療。

3.3.3 患部在臉上。

3.3.4 患部化膿。

##### 3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

- 3.4.4 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
- 3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- 3.4.6 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
- 3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
- 3.4.8 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
- 3.4.9 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- 3.4.10 一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。

#### 4 用法用量

1天1~2次	均勻塗抹患部。
--------	---------

#### 5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。
- 5.2.2 自覺狀況沒有改善或更惡化。
- 5.2.3 一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使症狀改善，若停藥後，病情復發亦應立即就醫。

#### 6 包裝

1000公克以下鋁軟管裝、塑膠罐裝。

#### 7 儲存方式

25°C以下保存。



**製造廠**

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路 8 4 號

**藥商**

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)